காலத்திற்கு முன், நல்ல உணவூட்டத்துடன் இருக்கும் பெண்மணிக்கு, கர்ப்பமடையும் போது அனைத்து சத்துக்களுடன் சேமிப்பு சிறப்பாக இருக்கும். எனவே வளரும் குழவியின் தேவைகள் கர்ப்பிணியின் உடல்நலத்தைப் பாதிக்காமல் பூர்த்தி செய்யப்படும். நல்ல உணவூட்டம் பெறும் குழவியே உடல்நலத்திலும், மூளை வளர்ச்சியிலும் சிறந்து விளங்கும்.

### உங்களுக்கு தெரியுமா?

பிரிமிபாரா – முதல் குழந்தை பெறும் பெண்

### கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் உடலியல் மாற்றங்கள்

குழவி வளர்ச்சியடையும் போது ஒரு பெண்ணின் உடலில் நிறைய உடலியல் மாற்றங்கள், உயிரியல் வேதி மாற்றங்கள் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனால் உணவூட்டத்தின் தேவைகளும் அவற்றை உடல் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வதிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படும்.

### பல்வேறு வகையான மாற்றங்கள் பின் வருமாறு

**i. அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற விகிதம் அதிகரித்தல்**

குழவியின் வளர்ச்சியின் காரணமாக BMR அதிகரிக்கும்.

**ii. உணவு குழாய் மண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்**

உணவு குழாய்களின் அசைவுகள் குறைவதால் மலச்சிக்கல் ஏற்படுகிறது.

**iii. ஹார்மோன் சுரப்பியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்**

கர்ப்பகாலத்தில் கீழ்கண்டவாறு ஹார்மோன்களின் சுரப்பு அதிகரிக்கிறது.

(i) ஆல்டோஸ்டீரோன்
(ii) புரோஜெஸ்டிரான்
(iii) தைராக்ஸின்
(iv) பாராதைராக்ஸின் ஹார்மோன்

**iv. உடலில் காணப்படும் திரவங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்**

இரத்தத்தின் கன அளவு 51% அதிகரிக்கிறது. வளரும் குழவிக்கு உணவுச் சத்துக்களை எடுத்து செல்லவும், குழவியின் கழிவுகளை வெளியேற்றவும் இந்த அதிகரிப்பு அவசியமாகிறது.

**v. சிறுநீரகச் செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்**

இரத்தத்தின் கன அளவு அதிகரிப்பதாலும், கிரியாட்டினின், யூரியா, குழவி மற்றும் தாயின் வளர்சிதை மாற்றத்தினால் உண்டாகும் கழிவுப் பொருட்கள் அதிகரிப்பதாலும், கிளாமரூலர் வடிகட்டும் விகிதம் அதிகரிக்கிறது.

**vi. கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் எடை அதிகரிப்பு**

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் எடை அதிகரிப்பில் பாதி பகுதி குழவி, நச்சுக் கொடி மற்றும் ஆம்னியாடிக் திரவத்தால் ஏற்படுகிறது. கர்ப்பகாலத்தில் விரும்பத்தக்க எடை அதிகரித்தம் 12.5 கிகி எடை ஆகும். இது 11-13 கிகி வரை எடை அதிகரிக்கலாம்.

## 6.7.1 கர்ப்ப காலத்திற்கான ஊட்டச்சத்து தேவைகள்

RDA – பரிந்துரைப்படி வயது வந்த பெண்களை விட கர்ப்ப காலத்தில் ஊட்டச்சத்து தேவை அதிகரிக்கும்.

### சக்தி

பின்வரும் காரணங்களுக்காக கூடுதலான சக்தி கர்ப்பக் காலத்தில் தேவைப்படுகிறது. அவை

(i) குழவியின் வளர்ச்சிக்கும், செயல்பாட்டிற்கும்,
(ii) நச்சுக்கொடி மற்றும் தாயின் உடலில் திசுக்கள் வளர்வதற்கும்
(iii) தாயின் உடல் அளவு அதிகரிப்பதால்
(iv) அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தில் (BMR) மாற்றம் ஏற்படுதல் போன்றவையாகும்.



Chapter 06.indd 31 18-01-2019 16:18:49