புரதம்:

கூடுதலான புரதம் கீழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காகத் தேவைப்படுகிறது.

1. குழவியின் வளர்ச்சி
2. நச்சுக் கொடி வளர்ச்சி
3. கர்ப்பப்பை மற்றும் மார்பக வளர்ச்சி
4. தாயின் இரத்தத்தின் கன அளவு அதிகரித்தல்
5. ஆம்னியாடிக் திரவ உற்பத்தி

கொழுப்பு:

ICMR - வல்லுநர் குழு கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு நாளைக்கு 30 கிராம் கண்களுக்கு புலப்படும் கொழுப்பை உட்கொள்ள வேண்டும்.

கால்சியம்:

கூடுதல் கால்சியம், குழவியின் எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் வளர்ச்சிக்கும், பாலூட்டும் பருவத்தில் ஏற்படும் அதிக தேவையினால் தாயின் கால்சியம் வள ஆதாரங்களைப் பாதுகாக்கவும் தேவைப்படுகிறது.

இரும்பு:

இரும்புச்சத்து தேவைகள் ஒரு நாளைக்கு 21 மி.கி லிருந்து 35 மி.கி ஆக உயர்கிறது.

இந்த கூடுதல் அளவானது கீழ்க்கண்ட காரணங்களால் தேவைப்படுகிறது.

(i) தாயின் உடல் திசுக்களின் பெருக்கம் சிவப்பணுக்களின் மொத்தப் பருமன் அதிகரித்தல், நச்சுக் கொடிக்குத் தேவைப்படும் இரும்புச்சத்தின் அளவு பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் இரத்த இழப்பு

(ii) குழந்தைப் பிறந்து 4-6 மாதங்களுக்கு நீடிப்பதற்கு தேவையான இரும்புச் சத்தை குழவியின் கல்லீரலில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் குழந்தையின் முதல் உணவாகியப் பாலில் இரும்புச் சத்தின் அளவு குறைவாக காணப்படுகிறது.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

உணவு அல்லாத சில தேவையற்றப் பொருட்களான மண், சாக்குகட்டி, மாவுப்பொருள் ஆகியவற்றை அடிக்கடி சாப்பிட வேண்டும் என்ற உணர்ச்சியே பிக்கா எனப்படும்.

அயோடின்:

அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற விகிதம் அதிகரிப்பதால் அயோடின் தேவைகளும் அதிகரிக்கிறது.

துத்தநாகம்:

துத்தநாக குறைவு கர்ப்பத்தை மிக மோசமாக பாதிக்கக்கூடியது. எனவே துத்தநாக குறைவு குழவி மரணத்தையும் குழவிக்கு குறை உருவாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் மேலும் கர்ப்பப் பையில் குழவியின் வளர்ச்சி விகிதமும் பாதிப்படைகிறது.

சோடியம்:

கட்டுப்பாடில்லாமல் வழக்கம் போல் சோடியம் உட்கொள்ள அறிவுரை வழங்கப்படுகிறது. நீர்த்தேக்கம் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் போது மட்டும் சோடியம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

உயிர்ச்சத்துக்கள்:

கர்ப்பகாலத்தில் உயிர்ச்சத்து A கூடுதல் அளவு தேவைப்படுகிறது. தாயினுடைய கால்சியம் உறிஞ்சும் திறன் மேம்படுவதால் உயிர்ச்சத்து D அவசியமாகிறது. உயிர்ச்சத்து K இயல்பான இரத்தம் உறைதலுக்குத் தேவையான புரோத்ரோம்பின் உருவாக்கத்திற்கு அவசியமாகிறது. இளங்குழவியின் இரத்தப் போக்கைத் தடுப்பதில் மிகவும் உதவியாக இருப்பதால் தாயின் இரத்தத்தில் உயிர்ச்சத்து K அதிகமாக காணப்படுவது அவசியமாகிறது. கர்ப்பக்காலத்தில் உயிர்ச்சத்து C பைரிடாக்சின் மற்றும் உயிர்ச்சத்து B_{12} ஆகியவற்றின் தேவைகள் அதிகரிக்கின்றன.

Chapter 06.indd 32 18-01-2019 16:18:50