∴போலிக் அமிலம்:

∴போலிக் அமிலம் கீழ்கண்ட காரணங்களுக்காக தேவைப்படுகிறது.

(i) கூடுதலான இரத்த உற்பத்தி (ஹெமட்டோபயாசிஸ்)

(ii) வளர்ச்சியின் அடிப்படை ஆக்க கூறுகளாகிய DNA, மற்றும் RNA உற்பத்தி அதிகரிப்பு

கர்ப்பக்காலத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

- குமட்டல் மற்றும் வாந்தி
- மலச்சிக்கல்
- நெஞ்செரிச்சல்
- நீர்த்தேக்கம் மற்றும் கால்களில் தசைப்பிடிப்புகள்
- பிக்கா
- இரத்த சோகை
- கர்ப்பத்தினால் ஏற்படும் உயர் இரத்த அழுத்தம் (PIH)
- கர்ப்பக்கால நீரழிவு நோய்

பாலூட்டும் காலம்:

போதுமான ஊட்டச்சத்துக்கள் பாலூட்டும் காலத்தில் தாய்க்கு கொடுக்கப்பட வேண்டியது மிகவும் முக்கியம். ஏனெனில் குழந்தை பிறந்தது முதல் சில மாதங்களில் தன்னுடைய ஊட்டச்சத்து தேவைகளுக்காகத் தாயின் பாலையே சார்ந்துள்ளது. பாலூட்டும் காலத்தில் ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைவு ஏற்பட்டால் அது சுரக்கும் பாலின் அளவையும், தரத்தையும் பாதிக்கும்.

தாய்ப்பால் சுரக்கும் விதம்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை 13-ல் பால் சுரத்தலின் ஹார்மோன்களின் பங்கு பற்றிய தொகுப்பை அளிக்கிறது.

பாலூட்டும் காலத்தில் தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்துக்கள்

ஒரு பெண்ணிற்க்கு ஒரு நாளைக்கு 850 மி.லி பால் சுரக்கும் என்ற கணக்கின் படி அதிலுள்ள சத்துக்களின் அளவைப் பொருத்தும் ICMR பாலூட்டும் தாய்க்கு ஊட்டச்சத்துக்களை பரிந்துரை செய்துள்ளது. பால் சுரக்கும் அளவு ஆரம்பத்தில் அதிகரித்து ஆறு மாதம் வரை அந்த அளவு நீடிக்கும். பிறகு படிப்படியாக குறைந்து விடும். எனவே ஊட்டச்சத்து தேவைகள், பாலூட்டும் காலத்திற்கு இரண்டு பிரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது 0-6 மாதங்கள் ஒரு மற்றொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சக்தி:

பாலூட்டும் தாய்க்கு பால் உற்பத்திக்காக கூடுதல் சக்தி தேவைப்படுகிறது. ஒரு நாளுக்கு சுரக்கும் பாலின் சரியான அளவு 850 மி.லி.

அட்டவணை 13 தாய்ப்பால் சுரத்தலில் ஹார்மோன்களின் பங்கு பற்றிய தொகுப்பு

வ. எண்	ஹார்மோன்	சுரக்குமிடம்	செயல்பாடு
1	ஈஸ்ட்ரோஜன்	கருப்பை	மார்பக வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது.
2	புரோஜெஸ்ட்டிரோன்	நச்சுக்கொடி	சுரப்பி செல்களைச் சுரப்பு செல்களாக மாற்றி மார்பகத்தைப் பால்சுரப்பதற்குத் தயார் செய்கிறது.
3	புரோலாக்டின்	முன்புற பிட்யூட்டரி	பால் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது.
4	ஆக்ஸிடாக்ஸின்	பின்புற பிட்யூட்டரி	சுரப்பி சிற்றறையிலிருந்து பாலை வெளியேற்றுகின்றது.

ஆதாரம்: ஸ்ரீலக்ஷ்மி (2011)

Chapter 06.indd 33 18-01-2019 16:18:50