பாலூட்டும் முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

புரதம்:

பால் உற்பத்திக்காக புரதத்தின் தேவை அதிகரிக்கிறது.

கொழுப்பு:

பாலிலுள்ள மொத்த கொழுப்பின் அளவு, தாயின் திட்ட உணவைப் பொருத்து அமைவது இல்லை. மேலும் பாலூட்டுவதற்கு தேவையான கூடுதல் சக்தித் தேவையைச் சமாளிக்க தேவையான சக்தி அடர்வினை கொழுப்பு தருகிறது.

கால்சியம்:

பாலூட்டும் காலத்தில், கால்சியத்தின் தேவை அதிகரிக்கிறது.

இரும்பு:

பெரும்பாலான தாய்மார்களுக்கு பாலூட்டும் காலத்தில் மாதவிலக்கு இன்மையால் (Lactational amenorrhoea) நாள் ஒன்றுக்கு 1 மி.கி இரும்புச் சத்து சேமிக்கப்படுகிறது. இல்லையெனில், இது மாதவிலக்கின் போது இழக்கப்பட்டிருக்கும். இரும்புச்சத்து உட்கொள்வதை சிறிது அதிகரிக்க வேண்டும்.

உயிர்ச்சத்துக்கள்

உயிர்ச்சத்து A யின் கூடுதல் தேவை, சுரக்கும் தாய்ப்பாலின் அளவைப் பொறுத்து அமையும். பாலூட்டும் போது கலோரிகள் மற்றும் புரதத்தின் தேவை அதிகரிக்கப்பதால் அதற்கேற்ப B கூட்டு உயிர்ச்சத்துக்களின் தேவையும் அதிகரிக்கும். பாலூட்டும் போது அஸ்கார்பிக் அமிலம் உட்கொள்வது அதிகரிக்கிறது.

காலக்டோகாக்ஸ்:

காலக்டோகாக்ஸ் என்பன பால் உற்பத்திற்கு உதவும் உணவுகள் ஆகும். பூண்டு, பால், பாதாம் ஆகியன பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. கூடுதல் மீன் மற்றும் ஆட்டிறைச்சி போன்ற உணவுகள் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும்

அட்டவணை 14 எளிதான வேலை செய்யும் கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்க்கான சைவ சீருணவு

வ. எண்	உணவு தொகுப்பு	கர்ப்பிணி பெண் அளவு (கி)	பாலூட்டும் தாய் அளவு (கி)
1	தானியங்கள், சிறு தானியங்கள்	300	330
2	பருப்புவகைகள்	60	90
3	பால் (மி.லி)	500	500
4	மண்ணுக்கடியில் விளைவன மற்றும் கிழங்குகளும்	100	100
5	பச்சை இலைக்காய்கறிகள்	150	150
6	மற்ற காய்கறிகள்	100	100
7	பழம்	200	200
8	சர்க்கரை	20	20
9	கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய் (தெளிவான)	30	30

ஆதாரம்: இந்தியர்களுக்கான உணவு வழிக்காட்டுதல் ஒரு கையேடு, தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம், ICMR ஹைதராபாத், இந்தியா (1999)

Chapter 06.indd 34 18-01-2019 16:18:51