என ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஓமம், வெந்தயம் சேர்க்கப்பட்ட சிறப்பு தயாரிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இவை, இரும்பு சத்து, புரதம், கால்சியம், B கூட்டு உயிர்ச்சத்துக்கள் ஆகியவற்றை வழங்குகின்றன.

தனிநபர் ஆய்வு

தனிநபர் ஆய்வு 2

ஜெனி கர்ப்பமாக இருப்பதால் அவர் ஊட்டச்சத்து ஆலோசனைக்கு வருகிறார். அவளுக்கு எந்த ஆறு ஊட்டச்சத்துக்கள் கர்ப்பகாலத்தில் அதிகம் தேவைப்படுகின்றன? அவற்றின் சிறப்பான பங்களிப்பை விளக்குக மற்றும் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள நான்கு உணவு ஆதாரங்களை பரிந்துரை செய்க.

6.8 முதுமைப் பருவத்தில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து தேவைகளும், சவால்களும்

60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர், வயது முதிர்ந்தோர் ஆவார். வயதானவர்களின் உடல் நலத்தைப் பேண முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதோடு "மூப்பியல் உணவூட்டம்" என்ற படிப்பிற்கும் வழி வகுத்துள்ளது.

மூப்படைதல் (Aging)

மாற்ற இயலாத உயிரியல் வேதி மாற்றமே மூப்படைதல் எனப்படும். இது ஒரு மனிதனின் வாழ்நாள் முழுவதும், இறக்கும் வரை தொடர்ந்து நடைபெறும் ஒரு மாற்றமாகும். முதியவர்களின் ஊட்டச்சத்து நிலை அவர்களின் திசுக்களின் ஊட்ட நிலையைக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. உணவுப் பற்றாக்குறை, சீரற்ற ஜீரணித்தல் மற்றும் உறிஞ்சுதல், ஊட்டச்சத்துக்கள், போதுமான அளவு திசுக்களைச் சென்றடையாமை, கழிவுப் பொருட்கள் அதிக அளவில் சேருதல் போன்ற காரணங்களால், செல்களுக்கு தேவையான ஊட்டம் கிடைப்பதில்லை.

ஒருவர் மூப்படையும் போது, செல்களின் வேலை செய்யும் திறன் குறைகிறது. ஹார்மோன்களின் செயலாற்றத்திற்கு உடல் ஒத்துழைப்பு தருவதும் குறைகிறது. மேலும் என்ஸைம்கள் உருவாதலும் குறைகிறது. இம்மாற்றங்கள், செல்களின் வேலை செய்யும் திறன் குறைவதால் ஏற்படுகிறது. செல்கள் ஒன்றோடொன்று ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் தன்மை கொண்டது. இத்தன்மை காரணமாக, ஒரு செல் இறப்பின் மற்ற செல்கள் வேலை செய்யும் திறனை இழக்கிறது. இதனால், அந்தக் குறிப்பிட்ட உடலுறுப்பின் செயல் பாதிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக ஒவ்வொரு உடலுறுப்பின் செயல்கள் பாதிக்கப்படும் போது இறப்பு நேரிடுகிறது.

முதுமைப்பருவத்தில் ஊட்டச் சத்து தேவைகள்

சக்தி:

உடல் எடையை சீராக வைப்பதற்குத் தேவையான கலோரியை உட்கொள்ள வேண்டும். சக்தியின் தேவை கீழ்க்காணும் காரணங்களால் குறைகிறது.

(i) குறையும் உடலியக்க செயல்பாடுகள்
(ii) எலும்போடு ஒட்டிய தசைகள் குறைந்து, கொழுப்புத் திசுக்கள் அதிகரித்தல்
(iii) உடல் இயைபுகள் மற்றும் உடலியல் செயல்பாடு குறைவதினால் 15-20 சதவீதம் வரை ஓய்வு வளர்சிதை மாற்றத்தின் விகிதம் குறைதல்.

புரதம்:

வயதானவர்களுக்கு புரதத்தின் தேவையில் எந்த விதமாற்றமும் தேவைப்படாது. பெரியவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் அளவே, இப்பொழுதும் அளிக்கப்பட வேண்டும். அதாவது 1கி.கிராம் உடல் எடைக்கு 1கிராம் புரதம் என்ற அளவில் புரதம் தரப்பட வேண்டும்.

Chapter 06.indd 35 18-01-2019 16:18:52