கார்போஹைட்ரேட்டு:

சக்தியின் தேவை குறைவதால் அதற்கு ஏற்றாற் போல் கார்போஹைட்ரேட்டு அளவும், உணவில் குறைக்கப்ப வேண்டும். குளுக்கோஸ் ஏற்புத்திறன் பாதிக்கப்படுவதாலும், மலச்சிக்கல் போன்ற குடல் சார்ந்த உபாதைகள் ஏற்படுவதாலும், கூட்டுச் சர்க்கரை உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

கொழுப்புசக்தியின் தேவை குறைவதால் அதற்கு ஏற்றாற் போல் கார்போஹைட்ரேட்டு அளவும், உணவில் குறைக்கப்பட வேண்டும். குளுக்கோஸ் ஏற்புத்திறன் பாதிக்கப்படுவதாலும், மலச்சிக்கல் போன்ற குடல் சார்ந்த உபாதைகள் ஏற்படுவதாலும், கூட்டுச் சர்க்கரை உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

கொழுப்பு:

சக்தி தேவைகள், குறைவதால் கொழுப்பு தேவையும் குறைகிறது. செறிவற்ற கொழுப்பு மற்றும் கொலஸ்ட்ராலின் அளவு குறைவாகவும், மற்றும் சமையலில் செறிவூட்டப்படாத கொழுப்பை பயன்படுத்த வேண்டும்.

தாதுஉப்புகள் சக்தி தேவைகள் குறைவதால் கொழுப்பு தேவையும் குறைகிறது. செறிவற்ற கொழுப்பு மற்றும் கொலஸ்ட்ராலின் அளவு குறைவாகவும், மற்றும் சமையலில் செறிவூட்டப்படாத கொழுப்பை பயன்படுத்த வேண்டும்.

தாதுஉப்புகள்:

எலும்புகளில் கால்சியத்தின் இழப்பால் ஏற்படும் நுண் துளைகளால் கால்சியத்தின் தேவை வயோதிகத்தில் அதிகரிக்கிறது. வயோதிகத்தில், கீழ்காணும் காரணங்களுக்காக 1000 மி.கிராம் கால்சியம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

- கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள் கிடைக்காமல் இருத்தல்
- வயதானதால் ஏற்படும் எலும்பு இழப்பு மற்றும் கால்சியத்தின் சமநிலையை சமன் செய்வதற்கும்.
- எலும்பு முறிதல் மற்றும் பற்கள் சிதைவடைதலை தடுப்பதற்கும்
- கால்சியம் உறிஞ்சப்படும் திறன் குறைவதால் ஏற்படும் இழப்பினை சரிசெய்வதற்கும் வயோதிகம் இரும்புச் சத்து தேவையைப் பாதிப்பதில்லை. எனவே, பெரியவர்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட இரும்புச்சத்தின் அளவே, வயதானவர்களுக்கும் அளிக்கப்படுகிறது. ஆகவே இரும்புச்சத்து போதுமான அளவு வயோதிகத்தில் உட்கொள்ள வேண்டும்.

உயிர்ச்சத்துக்கள்:

உயிர்ச்சத்து A தேவை, பெரியவர்களுக்கான அதே அளவாகும். அதாவது 600 µg ரெட்டினால் போதுமான அளவு சூரிய ஒளி உடலில் படாமல் இருக்கும் போது உயிர்ச்சத்து D யின் அளவு ஈடு செய்யப்பட வேண்டும். முதியவர்களின் உடல்நலத்தை உயிர்ச்சத்து E கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் உயிர்ச்சத்து C போன்ற ஆன்டி ஆக்ஸிடென்ட்களை ஊக்குவிப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இரைப்பை அழற்சி காரணமாக உயிர்ச்சத்து B_6 தேவையும் அதிகரித்துள்ளது. இது மட்டுமல்லாது நீர் அதிகமாக அருந்த வேண்டும். மோர், பழச்சாறுகள் மற்றும் சூப்புகள் உட்கொள்ளலாம். மலச்சிக்கலும் தவிர்க்கப்படுகிறது.

இரும்புச் சத்து குறைவினால் ஏற்படும் இரத்த சோகை மத்திய அமெரிக்கா முழுவதும் ஒரு தீவிர பொது நலப்பிரச்சனையாக உள்ளது. இந்தியாவைப் போல் மத்திய அமெரிக்காவிலும் அரிசி ஒரு நிலையான உணவு இது பொதுவாக தீட்டப்பட்டதாகவும், மற்றும் அரிதாக இரும்புச்சத்து செறிவூட்டப்பட்டதாகவும் உள்ளது.

முதியோர்களின் உணவூட்டம் சார்ந்த பிரச்சினைகள்

வயோதிகத்தில் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் அதிகமாக உள்ளது.

Chapter 06.indd 36 18-01-2019 16:18:52