

எ. கா.

செவிலியர் சஞ்சயின் அறையில் அமர்ந்து இரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவும், இரத்தம் அழுத்தமும் அதிகரித்து இருப்பதை விவரிக்கிறார். சரியான மருந்துகளை உட்கொள்வதன் மூலம் குறைந்தது வாரத்திற்கு இரு முறை உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமும் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர இயலும் என அறிவுறுத்துகிறார். மேலும் உப்பு அதிகம் உள்ள உணவுகள், சிவப்பு இறைச்சி போன்றவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்துகிறார். நோயாளி செவிலியர் கூறியவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் பரிசோதனைக்கு வருவதற்கு ஏற்றுக்கொண்டார். ஒருவேளை இதற்கிடையில் சற்று மோசமாக உணர்ந்தாலோ அல்லது மாற்றங்கள் தோன்றினாலோ மருந்துவமனைக்கு வருமாறு அல்லது தொலைப்பேசியில் ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துகிறார்.

செயல்படுத்துதல் நிலை(Implementation phase)

திட்டமிட்டபடி செயல்பாடுகளை முறைப்படி நடத்தும் நிலை எனலாம். இந்த திட்டம் என்பது ஒவ்வொரு நோயாளிக்கு குறிப்பிட்ட விளைவு அடையக் கூடியது. இந்நிலையில் நோயாளியின் உடல் நலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் பயன்கள் அல்லது முன்னேற்றம் கவனிக்கப்படுகிறது. நோயாளியை நேரடியாக கண்காணிப்பது, தேவையான மருத்துவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது, உடலநலத்தை பாதுகாப்பதற்கு ஏதுவாக அவசியமான நடைமுறைகள் பற்றி எடுத்துக்கூறி அறிவுறுத்துவது மற்றும் தொடர்ச்சியான மருத்துவ உதவிக்கு ஆலோசனை மற்றும் தொடர்புகள் குறித்து வலியுறுத்துவது போன்ற பல செயல்களை இந்நிலை உள்ளடக்கியுள்ளது. திட்டமிட்டபடி செயலை நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதற்கான காலவரையறை மணிநேரம், நாட்கள் வாரங்கள் அல்லது பல மாதங்கள் வரை மாறுபடலாம்.



எ. கா.

சஞ்சய், மருத்துவ ஆலோசனைப்படி மருந்து மற்றும் உணவு முறைகளைக் கடைபிடித்தார். ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு ஒரு நாள் மிகவும் சோர்வாக உணர்ந்தவுடன், மருத்துவமனை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டார். அப்போது, செவிலியர் மருந்து எடுப்பதால் வரும் பக்க விளைவாக குமட்டல் வரலாம் எனவும், அதைத் தவிர்க்க சீரக நீரை அருந்துமாறு அறிவுறுத்துகிறார். மேலும் வயிற்றுக்கு சிரமம் தரக்கூடிய உணவுகளை தவிர்க்குமாறு கூறுகிறார். செவிலியரின் அறிவுரைப்படி சஞ்சய் மருந்து மற்றும் உணவு முறைகளை கடைபிடித்துக்கொண்டு இரண்டு வாரங்களில்நான்குமுறைஉடற்பயிற்சிக்கும்

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_4.indd 108 22-02-2019 3.41.09 PM