## 4.4 நோயாளியை வீட்டுக்கு அனுப்புதல்

### 4.4.1 முன்னுரை:

மீனா ஒரு வாரம் மருத்துவமனையில் தங்கி, வலது காதில் ஏற்பட்ட வலிக்காக, முழுமையான பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டார். அவர் நன்கு குணமடைந்ததை அறிந்த மருந்துவர் மீனாவை வீட்டுக்குச் செல்லலாம் என்ற நல்ல செய்தியைக் கூறினார். இதைக்கேட்ட மீனா உடனே உடைகளை மாற்றி வீடு செல்வதற்காக ஆயத்தமானார். மருத்துவமனை படுக்கை தொகுதியில் இருந்து வீட்டிற்கு செல்வதற்கு முன் வழக்கமான நடைமுறைகளை முடிக்க வேண்டும்.

### 4.4.2 வரையறை

நோயாளியை மருத்துவமனையில் இருந்து அனுப்புதல் என்பது அவரை வீடு செல்வதற்கு ஆயத்தப்படுத்துதல் எனலாம்.

### 4.4.3 நோயாளியை வீட்டுக்கு அனுப்புவதன் நோக்கங்கள்

1. நோயாளி வீட்டுக்குச் சென்ற பின்பும் சரியான மருத்துவக்கண்காணிப்பை தொடர உறுதி செய்தல்
2. நோயாளியை வீட்டுக்கு அனுப்பும் அனைத்து நடைமுறைகளுக்கும் உதவுதல்.

### 4.4.4 வெளியேற்றுதலின் வகைகள் ( Types of Discharge )

1. நோயாளியை வீட்டுக்கு அனுப்புதல்: மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி உடல் முன்னேற்றத்தை அடைந்த நோயாளிகளை வீட்டுக்கு அனுப்புதல்
2. மருத்துவரின் அறிவுரையை மீறி வெளியே செல்லுதல் (AMA): நோயாளி மருத்துவரின் அறிவுரையையும் மீறி மருத்துவமனையை விட்டு வீடு செல்லுதல்.
3. தலைமறைவாதல் (Absconding) அல்லது சொல்லாமல் வெளியேறுதல்: நோயாளி மருத்துவமனையின் ஊழியர்களுக்குத் தெரியாமல் வெளியேறுதல் அவ்வாறு வெளியேறிய நோயாளியை தலைமறைவானவர் என பதிவேடுகளில் குறிப்பிடுவர்.

**உண்மை**

வெளியேற்றம் நடைமுறை குறைந்த பட்சம் இரண்டு மணி நேரம் நீடிக்கும். செவிலியர் மருந்தகம், தொகை செலுத்துமிடம், உணவு வழங்கும் இடம் மற்றும் பலவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து நோக்கத்தை ஒரு மணி நேரத்தில் முடிக்க வேண்டும்.




புள்ளி விவரங்களின் படி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளில் 70%-80% மனக்குழப்பத்துக்கு ஆளாகின்றனர். எனவே அவர்களுக்கு செவிலியரின் ஆதரவு மருத்துவ மனையிலிருந்து வெளியேறும் வரை தேவைப்படுகிறது.



மாணவர் செயல்பாடு

மருத்துவ மனையில் இருந்து வெளியேறுதல் நடைமுறையை பங்கேற்று நடித்தல். (Role Play)



Nursing_Vocational_Tamil_Unit_4.indd 115 22-02-2019 3.41.10 PM