சிறப்பம்சம்

வலிமையான செவிலி நோயாளியின் தலை மற்றும் தோள்பட்டைப் பகுதியிலோ அல்லது பெண் நோயாளியின் இடுப்பு பகுதியின் அருகிலோ நிற்க வேண்டும்.



மாணவர் செயல்பாடு

தூக்குதல், நகர்த்துதல், மாற்றுதல்,போன்றசெயல்முறைகளை ஒருவருக்கொருவர் செய்து பார்த்தல்



சமீபத்திய ஆய்வின் படி 12 வாரங்கள் யோகா பயிற்சி மேற்கொண்டவர்களுக்கு முதுகுவலிக்கான பயன்கள் மிக குறைந்த அளவே காணப்பட்டது.

4.12 ஆக்ஸிஜன் தேவை

4.12.1 முன்னுரை

இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்து நீலம்பரித்தல் ஏற்படும் பொழுது ஆக்ஸிஜன் அளிக்கப்படுகிறது. சுவாசக் கோளாறுகள் உள்ள நோயாளிகளுக்கு ஹைப்பாக்ஸீமியா அல்லது அனாக்சிமியாவை போக்குவதற்கு ஆக்ஸிஜன் அளிக்கப்படுகிறது. இரத்தத்தில் சாதாரணமாக ஆக்ஸிஜன் அளவு 80–100 mmHg ஆகும். 60 mmHg க்கு குறையும் பொழுது. உடலில் மாறுபாடுகள் தோன்றுகின்றன. மூளையின் செல்கள் 20% உடலின் ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக் கொள்ளுகின்றன. 3–5 நிமிடமே ஆக்ஸிஜன் அற்ற நிலையில் உயிர் வாழ்கின்றன.

4.12.2 நோக்கம்

- இரத்தத்தில் சாதாரண ஆக்ஸிஜனின் அளவில் குறைவு ஏற்படும் பொழுது ஆக்ஸிஜன் அளிக்கப்படுகிறது.

4.12.3ஆக்ஸிஜன் செலுத்துவதற்கான காரணங்கள்.

1. ஆஸ்துமா, நுரையீரல் வளித்தேக்கம், எம்பசீமா, (Emphysema) இதயக் குறைபாடு போன்ற சுவாசத்தடை உள்ள நோயாளிக்கு
2. வீங்கிய அல்லது வளர்ந்த தைராய்டின் காரணமாக காற்றுக் குழாய் அடைபடுதல்,
3. நீலம் பரித்தல்
4. அதிர்ச்சி மற்றும் இரத்த ஓட்டத்தடை
5. அதிக இரத்த ஒழுக்குக்குப் பின்
6. இரத்த சோகை
7. நோயாளி மயக்கத்தில் இருக்கும் போது
8. ஏதாவது காரணத்தில் ஏற்படும் மூச்சுத் திணறல் (எ.கா. மூழ்குதல், விஷவாயுக்களை சுவாசித்தல், தூக்கிடுதல்).
9. இரசாயனத்தால் விஷமேறுதல் திசுக்களின் தன்மையைப் பாதித்து ஆக்ஸிஜன் பயன்படுத்துதலைப் பாதிக்கும் எ.கா. சையனைடு விஷம்.
10. கார்பன் மோனாக் ஸைடு விஷவாயுத்தாக்கம்
11. மார்பு மற்றும் தைராய்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப்பின்
12. சுற்றுப்புறத்தில் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்து காணப்படல்
13. காற்றுப் பசி

4.12.4ஆக்ஸிஜன் அளிக்கும் முறைகள்

ஆக்ஸிஜன் அளித்தல் நோயாளியின் நிலையையும் தேவைப்படும் அடர்த்தியையும் மற்றும் மருத்துவரின் அறிவுரைப்படியும் அளிக்கப்படுகிறது. கீழ்க்கண்ட முறையில் ஆக்ஸிஜன் அளிக்கப்படுகிறது.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_4.indd 142 22-02-2019 3.41.22 PM