- ஆனால் நோய்தொற்றை மருந்துகள் குணமாக்க விலை யெனில் எண்டோஸ்கோபி, சைனஸ் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும்.

2. விலகிய மூக்குச்சுவர் (deviated septum) :

மூக்குத் தண்டு என்பது வலது, இடது பகுதிகளை சமமாக பிரிக்கும்படி நடுவில் அமைந்துள்ளதாகும். 80% மூக்குசுவர் சற்று மையத்தை விட்டு விலகியுள்ளது. ஆனால் அதிகமாக மையப்பகுதியைவிட்டு விலகியிருப்பதை 'விலகிய மூக்குச் சுவர்' என்கிறோம். அதனால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளாவன.

- ஒன்று அல்லது இரண்டு மூக்குத்துளைகளும் அடைத்துக்கொள்வதால் மூக்கு வழியாக சுவாசித்தல் கடினமாகிறது.
- மூக்கடைப்பு
- மூக்கில் இரத்த ஒழுக்கு அடிக்கடி ஏற்படுதல்
- முகத்தில் வலி, தலைவலி
- குழந்தைகளிடம் ஒலியுடன் கூடிய சுவாசம்.



- செப்டோபிளாஸ்டி என்ற அறுவை சிகிச்சை மூலம் விலகிய மூக்குச்சுவரை சரிபடுத்தலாம். மூக்கு சுவாசத்தை சரி செய்ய பயன்படுகிறது. சைனஸ் அறுவை சிகிச்சையுடன் இணைத்து செய்யப்படுகிறது.
- மூக்கிலுள்ள கட்டிகள் அல்லது பாலிப்புகளை அகற்றுவதற்கு முன்னதோ அல்லது மூக்கின் உட்புறம் பரிசோதனை செய்வதற்கு முன்னரோ மூக்குத் தொண்டை நிபுணரால் செய்யப்படுகிறது.

3. மூக்கு சிறுகட்டிகள் (Nasal polyps) :

ஒவ்வாமையின் காரணமாக மூக்கின் உட்புறம் அல்லது சைனஸ் குழிகளில் தோன்றும் கட்டிகள் புற்றுநோய் சார்ந்தவை அல்ல. சிறிய கட்டிகள் எந்த அறிகுறிகளையும் ஏற்படுத்துவதில்லை. ஆனால், பெரிதாக வளர்ந்தவைகளோ அல்லது பல பாதிப்புகள் இருந்தாலோ அடிக்கடி நோய்த் தொற்று அல்லது மூச்சு பிரச்சனையை உருவாக்கும்.



சுருங்க வைக்கும் அல்லது நீக்கும் மருந்துகளே போதுமானவை. ஆனால் அறுவை சிகிச்சை மூலம் நீக்குதலும் மருந்துகள் அளித்தலுமே மீண்டும் தோன்றுதலைத் தடுக்கும்.

5.7.3 மூக்கு சுத்தம் அல்லது சுகாதாரம்:

மூக்கு சுத்தம் மிகவும் எளிமையானது.

பிரச்சினைகள்

1. மூக்கின் உட்புறம் சுரக்கும் சுரப்புகள் உலர்ந்திருக்குமானால் நுகர்தல் மற்றும் சுவாசித்தலை பாதிக்கும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_5.indd 183 22-02-2019 3.42.02 PM