- தொற்று நீக்ககரைசலில் வெப்பநிலைமானியை 2 முதல் 5 நிமிடங்கள் வைக்கவும்.
- மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றவாறு பொருள்களை சோதனை தட்டில் (Tray) சரியாக வைக்க வேண்டும்.

உடல்வெப்ப நிலையின் மாற்றங்கள் உள்ள நோயாளிக்கு செவிலியர் கவனிப்பு

ஹைபர்தெர்மியா (Hyperthermia)

- குழாய் நீர் குளியல் (Tepidsponge)
- தண்ணீருடன் ஸ்பிரிட் கலந்த நீரில் குளியல்
- குளிர்மின்விசிறி
- ஒய்வுநேரம் அளித்தல்
- முறையான குறிப்பிட்ட அளவு உடற்செயல்பாடு அளித்தல்.
- வெப்பத்தை ஏற்படுத்தும் போர்வையை நோயாளியின் உடலில் இருந்து விலக்கிவிடுதல்.
- வெப்பத்தை கடத்தல்-குறைத்தல் நிலையை மேம்படுத்தும்.
- நீர் வெளியேற்றத்தை ஈடு செய்ய ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 3 லிட்டர் அளவுக்கு நோயாளிக்கு திரவ உணவு அளிக்க வேண்டும்.
- வாய் சுத்தத்தைக் கவனிக்க வேண்டும்.
- பசி எடுத்தலை தூண்டி சமசத்துள்ள உணவை உட்கொள்ள ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
- உடலின் திசுக்களுக்கு கூடுதலாக ஆக்சிஜன் அளிப்பதற்காக ஆக்சிஜன் செலுத்த வேண்டும்.
- உடலுக்கு அதிக அளவில் குளிர்ச்சி ஏற்படாதவாறு சுற்றுப்புற வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும.(குளிர்காற்றாடிகள்)

வெப்ப அதிர்ச்சி (Heat stroke)

செவிலியர் நோயாளிக்கு கீழ்கண்டவைகளை அறிவுறுத்த வேண்டும்.

- வெப்ப சூழலில் அதிக வேலை செய்வதை தவிர்ப்பது.
- வேலை செய்வதற்கு முன்னும், உடற்பயிற்சிக்குப் பின்னும் பழரசபானங்களைக் குடித்தல்.
- தளர்ச்சியான பருத்தி ஆடைகளை அணிதல்.
- காற்றோட்டம் இல்லாத இடங்களில் உடற்பயிற்சி செய்வதைத் தவிர்த்தல்.
- வெளியில் செல்லும் போது வெயில் தாக்காதவாறு தலைக்கு தொப்பி அணிதல்.

ஹைப்போதெர்மியா (hypothermia)

நோயாளிகளுக்கு உடல் வெப்பக் குறைப்பு (ஹைப்போதேர்மியாவை) தடுக்கும் முறைகள் பற்றி கற்பித்தல்.

- மீண்டும் உடல் வெப்பம் குறையாத படி தடுத்தல்.
- ஈரமான துணியை நோயாளின் உடலில் இருந்து எடுத்துவிட்டு, உலர்ந்த துணியை போர்த்தி கம்பளியினால் உடலை போர்த்தவும்.
- நோயாளி சுய நினைவுடன் இருந்தால் குடிப்பதற்கு வெது வெதுப்பான பால் அல்லது சூப் கொடுக்கவும்.
- மிதமான வெப்பநிலை உள்ள அறையில் நோயாளியை படுக்க வைக்கவும்.
- நோயாளிக்கு அவசர சிகிச்சை தேவைப்படும் பொழுது இருதய துடிப்பு சீரற்ற நிலை மற்றும் உப்புச் சத்துக்களின் விகிதம் போன்றவற்றை சரியாக கண்காணிக்க வேண்டும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd 206 22-02-2019 3.42.37 PM