நாடித்துடிப்பினை பாதிக்கும் காரணிகள்

உடற்பயிற்சி: குறைவான கால பயிற்சி எடுத்துக் கொள்வதால் நாடித்துடிப்பு வீதம் அதிகரித்தல். ஓட்டப் பந்தயத்தில் கலந்து கொண்டு அதிக நேரம் பயிற்சியில் ஈடுபட்டவருக்கு ஓய்வு நேரத்தில் நாடித்துடிப்பு வீதம் குறைகிறது.

உடல் வெப்பநிலை: காய்ச்சல் மற்றும் வெப்பம் நாடித்துடிப்பின் வீதத்தை அதிகரிக்கும். உடல் வெப்ப குறையும் போது நாடித்துடிப்பு குறையும். வலி மற்றும் பதட்டம் நாடித்துடிப்பின் வீதம் அதிகரிக்கும்.

உணர்ச்சி: வலி மற்றும் பயம் இருந்தால் நாடித்துடிப்பு அதிகரிக்கும்.

மருந்துகள்: எஃபி நெஃப்ரின் என்னும் மருந்து நாடிதுடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கும். டிஜிடலிஸ் என்னும் மருந்து நாடிதுடிப்பு வீதத்தை குறைக்கும்.

இரத்தக்கசிவு: இரத்தக் கசிவு நாடித்துடிப்பை அதிகரிக்கும்.

உடலின் மாற்றநிலை: நோயாளி நின்று கொண்டும் அல்லது உட்கார்ந்த நிலையில் நாடித்துடிப்பு அதிகரிக்கிறது. படுத்துக்கொண்டு இருக்கும் நிலையில் நாடித்துடிப்பு குறைகிறது.

நுரையீரலின் நிலை: நுரையீரல் பாதிக்கப்படும் பொழுது ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்தும் அத்துடன் நாடித்துடிப்பின் வேகம் குறைகின்றது.

நாடித்துடிப்பை கணக்கிடுவதின் நோக்கங்கள்:

- உடல் ஆரோக்கியத்தை பரிசோதிப்பதற்கும், இதயத்தின் செயல் அறியவும்.
- தமனிகளின் ஆரோக்கிய நிலையை அறிவதற்கும் அவற்றின் மீளும் தன்மையை பரிசோதிக்கவும்
- தமனி மண்டலத்தில் செல்லக் கூடிய ரத்தத்தின் அளவை சுமாராக கணக்கிடுவதற்கு
- உடல் உறுப்புகளில் இரத்த ஒட்டத்தில் ஏற்படும் தேவையான மாறுதல்களை அளவிடுவதற்கு
- பொதுவாக உடலின் நிலையை மற்றும் முன்னேற்றத்தை அல்லது இறப்பினைக் கண்டுப்பிடிப்பதற்கும்.
- அசவர சிகிச்சை தேவைப்படின் அந்நிலையில் நாடித்துடிப்பை அறிதல்

பொதுவானக் கருத்துக்கள்:

செயல் முறை:

- நாடித்துடிப்பை கணக்கிடுவதற்கு கடிகாரம் பயன்படுகிறது.
- வரைபடமும், பேனாவும் நாடித்துடிப்பை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுகிறது.
- நோயாளியை வசதியான நிலையில் வைத்தல்
- மணிகட்டினை உறுதியாகப் பிடித்து முதல் மூன்று விரல்களை தமனியின் மீது அழுத்தி பிடித்து நாடித் துடிப்பை கணக்கிடுதல்
- ஒரு நிமிடத்திற்கு நாடித்துடிப்பின் அளவை கணக்கிடுதல்
- நாடித்துடிப்பினை அளவிடும் போது ஏற்படும் ரிதம், கொள்ளளவு மற்றும் மாறுபட்ட நாடித்துடிப்பின் மாற்றங்களை அறிதல்
- நோயாளியின் நாடித்துடிப்பை பதிவு செய்தல்

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd 209 22-02-2019 3.42.37 PM