


அடர்த்தி எண்:

அடர்த்தி எண் என்பது சம அளவு திரவம், சம அளவு எடை நீரின் அடர்த்தியோடு ஒப்பிடுதலாகும்.

சிறுநீர் – வளர்ச்சி ஊடகம் (urine culture)

இதற்கு நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட கலனில் சிறுநீர் மாதிரி சேகரிக்கப்பட வேண்டும். இதில் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி குறித்த அறிக்கையை கொடுப்பதற்கு ஆய்வகத்திற்கு 24–48 மணி நேரம் தேவை.

சிறுநீரில் சர்க்கரை பரிசோதனை:

சிறுநீரில் சர்க்கரை பரிசோதனை செய்வதன் மூலம் மருத்துவர் சர்க்கரையின் அளவை அறிந்து அதற்கு ஏற்ப நோயாளிக்கு இன்சுலின் (insulin) மருந்து கொடுக்க வழிவகுக்கும்.

நோயாளியை தயார் செய்தல்:

1. முந்திய நாளே நோயாளிக்கு செய்முறையை விளக்கவும்.
2. நோயாளிக்கு எந்த நேரத்தில், எவ்வளவு சிறுநீரை எப்படி சேகரிக்க வேண்டும் என்பதை விளக்கி சொல்ல வேண்டும்.
3. சரியான சிறுநீர் மாதிரிக் கொடுத்து அதை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை விளக்கவும்.
4. சிறுநீர் கலனின் வெளிப்புறத்தை அசுத்தப்படுத்த வேண்டாம் என அறிவுறுத்தவும்.
5. பிறப்பு உறுப்பை சோப்பும் நீரும் கொண்டு கழுவி தூய்மையாக்கும் படி கூறவும்.
6. நோயாளியால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் செவிலியர் உதவலாம்.

தேவையான பொருள்களை தயார் செய்தல்:

சரியான முறையில் சேகரிக்கப்பட்ட சிறுநீர் சரியான முடிவை அளிக்கும். விரைவாக பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படவேண்டும். அசிடோன் மற்றும் சர்க்கரை பரிசோதனை விரைவாக செய்யப்பட்டு முடிவுகள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பார்க்கப்பட வேண்டும். மிக விரைவாகவோ மிக தாமதமாகவோ முடிவுகள் பார்க்கப்படும் போது சரியான முடிவைக் காணமுடியாது.

நோயாளியின் நிலை

சிறுநீரில் சர்க்கரை (urine sugar) காணப்பட்டால் க்ளைகோசூரியா (glycosuria) என்றும், அசிட்டோன் (actone) காணப்பட்டால்

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd 220 22-02-2019 3.42.39 PM