அடையாளங்கள் :

- நாடித்துடிப்பு அதிகரித்தல்
- இரத்த அழுத்தம் குறைதல்
- கண்மணிகள் விரிந்து போதல்
- பார்வை மங்கலான கண்கள்
- கை மற்றும் கால்கள் நடுக்கம் மற்றும் உதறல்
- சுயநினைவற்றதன்மையின் ஆரம்பநிலை.

சிகிச்சை முறை

அ) உடனடியாக நோயாளியை வசதியான நிலையில் வைக்க வேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?


- பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு தண்ணீர் குடிக்கவோ,அசைக்கவோ கூடாது. அவருக்கு தாகம் இருந்தால் சிறிதளவு தண்ணீரைக் கொண்டு உதட்டை மட்டும் நனைத்து விட வேண்டும்.
- பாதிக்கப்பட்டவரை தனியாக விடக்கூடாது
- சூடான தண்ணீர் பாட்டில் அல்லது வேறு எந்த நேரடி ஆதாரத்தையும் வெப்பப்படுத்தக் கூடாது.

ஆ) அந்த நபரை படுக்கையில் படுக்கச் செய்தல்

இ) இருதயத்துக்கான இரத்தஓட்டம் அதிகரிக்கும் வண்ணம் உடலின் கீழ்ப்பகுதியினை சற்று உயர்த்தி வைக்கவேண்டும்.

ஈ) தலையில் அடிபட்டதற்கான அறிகுறிகள் இருப்பின், மூளையில் ஏற்படும் இரத்தஅழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வண்ணம் தலையை சற்று உயர்த்திய நிலையில் வைக்கவும்.

உ) சுவாசிப்பதில் சிரமம் இருப்பின், பாதிக்கப்பட்டவர் வசதியாக இருக்க அவரது தோள் மற்றும் தலையை சற்று உயர்த்திய நிலையில் வைக்கவும்.



ஊ) இரத்த ஓட்டம் மற்றும் சுவாசம் சீராக அமைய வசதியாக ஆடைகளை தளர்த்தவும்

எ) இதயத்துடிப்பு மற்றும் சுவாசம் நின்று விட்டால் உடனே

- சுவாசத்தை மீட்கும் அவசர உதவியை உடனடியாக தொடங்கவேண்டும்.
- பாதிக்கப்பட்டவர் குணமடைவதற்கு ஏதுவான நிலையில்வைக்கவும் (*Recovery Positioning*)
- நல்லகாற்றோட்டத்துக்கு ஏதுவாக வசதி செய்ய வேண்டும்.
- பாதிக்கப்பட்ட நபரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பவேண்டும்.



- இறுக்கமான ஆடைகளை தளர்த்து
- தலையை அணைத்துக்கொள்

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_7.indd 238 22-02-2019 3.43.11 PM