மாணவர் செயல்பாடு

அவசர பிரிவில் கடிபட்ட இடத்தில் மிகுந்த வலி மற்றும் குத்திய அடையாளங்களுடனும் சிவந்த வீக்கத்துடன் ஒரு நபரை காண்கின்றீர்கள். என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?

தேள்கொட்டு :

- பொதுவாககொட்டுகள்அபாயகரமான துஎன்பதைவிடகடுமையானவலிஏற்படுத்துபவை. அவைசிலருக்குஅலர்ஜியை உருவாக்கும்மற்றும்சிலருக்குஅனபிலாடிக் (Anaphylactic) அதிர்ச்சியைஉருவாக்கவும்செய்யும்.



அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் :

- அரிப்பு மற்றும் வீக்கம்
- எரிச்சலுடன் கூடிய வலி
- அதிகப்படியான உணர்வு அல்லது உணர்வின்மை
- கண்ணீர் வடித்தல்
- அதிக உமிழ் நீர்சுரப்பு
- வாந்திவரும் உணர்வு அல்லது வாந்தி
- அதிகப்படியான வியர்வை



சிகிச்சை :

- கொட்டுப்பட்டஇடம்வெளிப்புறத்தில்இருப்பின் (Extsemity) அழுத்தம்தரும்ரப்பர்குழாயைஅவ்விடத்துக்குசற்றுஅருகேபொருத்தவும். பின்னர்அதைஓவ்வொ 5–10 நிமிடங்களுக்குஒருமுறைதளர்த்தவும்.
- விஷம்பரவும்வேகத்தைக் குறைக்கபனிக்கட்டிகளை(ICE PACK) பயன்படுத்தவும்
- பாதிக்கப்பட்டவரைஉடனடியாகமருத்துவமனைக்குஅனுப்பவும்



Nursing_Vocational_Tamil_Unit_7.indd 252 22-02-2019 3.43.17 PM