இழுத்துக்கொண்டு,பாதிக்கப்பட்டவரின் வாயை உதடுகளால் மூடி அடைத்துக் கொள்ளவும்.

ஈ) மூச்சை முழுவதுமாக பாதிக்கப்பட்டவரின் வாயில் செலுத்தவும். அதேவேளையில் அவரின் மார்பு உயர்கிறதா எனக் காணவேண்டும். குறைந்தது இரண்டு வினாடிகளில் முழுமூச்சையும் செலுத்தவும்.



உ) உதடுகளைஎடுத்துவிட்டுஅடிபட்டவரின் மார்பு கீழே இறங்கும்படி செய்யவும். அதற்கு நான்கு வினாடிகள் தேவை. மேலே கூறியபடி மீண்டும் ஒருமுறை செய்துவிட்டு பின்னர் சுவாசத்துக்கான அறிகுறி இருக்கிறதா என சோதிக்கவும்.

ஊ) பாதிக்கப்பட்டவரின் மார்பகம் உயர்ந்து தாழ்ந்தால், காற்று நுரையீரல் நுழைந்து வெளியேறுகிறது என்று பொருள்.

மார்பக அழுத்தம் கொடுத்தல்

அ) பாதிக்கப்பட்டவரின் இதயத் துடிப்பை கார்டோடிட் (Carotid) துடிப்பை 10 வினாடிகள் சோதிக்கவும்

ஆ) பாதிக்கப்பட்டவரின் அருகே முழங்காலிட்டு அமர்ந்து 4வது மற்றும் 5வது விலா எலும்பு இடைவெளியைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

இ) உங்களுடைய உள்ளங்கையின் அடிப்பகுதியை மார்பு எலும்பின் கீழ் பகுதியில் வைக்கவும், அதுவே அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய இடம்.

ஈ) இரண்டு கைகளையும் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக வைத்து விரல்களை பிணைத்துக் கொள்ளவும்

உ) பின்னர்கைகள் மடங்காமல் பாதிக்கப்பட்டவரின் மார்பு எலும்பின்மீது செங்குத்தாக அழுத்தவும். அழுத்தும்போது மார்பு எலும்பு 4-5 செ.மீ. மார்புக்கூட்டின் உள்ளே இறங்க வேண்டும்.

ஊ) நிமிடத்திற்கு 100 முறைவீதம் சுமார் 15 நிமிடங்களுக்கு வேகமாக அழுத்தவும். பின்னர் இரண்டுமுறை செயற்கை சுவாசமுறையை செயல்படுத்தவும்.

எ) நீங்கள் ஒருவர் மட்டுமே காப்பாற்றுபவர் என்றால், அழுத்தும் நேரத்தைக்கணக்கிட 1 முதல் 100 வரை பதினைந்து முறை எண்ணிக்கொண்டு செயல்படவும்.

ஏ) பாதிக்கப்பட்டவரின் வாயின் வழியாக நீங்களே தொடர்ச்சியாக சுவாசத்தை உள்ளே செலுத்தவேண்டும். இந்த செயலின்போது பாதிக்கப்பட்டவர் வெளி மூச்சு விடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஐ) அடுத்து ஒரு நிமிடத்துக்கு CPR முறையைத் தொடரவும், பின்னர் பாதிக்கப்பட்டவரின் நாடித்துடிப்பைச் சோதிக்கவும் உடனடியாக மருத்துவ உதவிக்கானத கவலைத்தந்துவிட்டு CPR முறையை, பாதிக்கப்பட்டவர் சுவாசிக்கும்வரை தொடரவும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_7.indd 258 22-02-2019 3.43.19 PM