சிறு குழந்தைகளுக்கான செயற்கை சுவாசம் முறை :

அ) எட்டு வயதுக்கு மேலான குழந்தைகளுக்கு பெரியவர்களுக்கான CPR முறையை செயல்படுத்தலாம். குழந்தையின் வயதை சரியாக அறிய முடியாதநிலையில், அவசரக்காலத்தில், குழந்தையின் உடல் அளவை உங்களது கையின் அளவுடன் ஒப்பிட்டு வயதை தீர்மானிக்கலாம்.

ஆ) உதாரணமாக குழந்தை சிறியதாக இருந்தால் ஒருகையையும், மிகவும்சிறிய குழந்தையாக இருப்பின் இரண்டு அல்லது மூன்று விரல்களைக்கொண்டு CPR செய்யலாம்.

இ) குழந்தையின் முகம் சிறியதாக இருந்தால் உங்களது வாயால் குழந்தையின் வாய் மற்றும் மூக்கை மூடவும். குழந்தையின் நெஞ்சுசற்று உயரும்அளவுக்குசெயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும்.

ஈ) குழந்தையின் கழுத்துத் தமனியின் நாடித்துடிப்பைபார்க்கவும்.நாடித்துடிப்பு இருந்தால் மார்பக அழுத்தத்தை நிறுத்தி செயற்கை சுவாசம் அளிப்பதை நான்கு நொடிக்கு ஒரு முறை செய்யவும்.

உ) கழுத்துத் தமனியில் நாடித்துடிப்பு இல்லையெனில், சரியான அழுத்தும் இடத்தைதேர்வுசெய்து,பெரியவர்களுக்கு மார்பை அழுத்தி சுவாசம் கொடுப்பது போல் தொடரவும்.

ஊ) உள்ளங்கையின் அடிப்பகுதியைப் பயன்படுத்தி 1 முதல் 1 ½ அங்குலம் (2.5 to 3.8 செ.மீ) மார்பை கீழ்நோக்கி அழுத்தி இருதயத்தை செயல்படவைக்கவும்.



7.20 கட்டுத்துணிகள் மற்றும் ஸ்லிங் (Bandages and slings)

கட்டுத்துணிகள் காயங்களுக்கு கட்டுப்போடவும், இரத்தப்போக்கை கட்டுப்படுத்தவும், காயம்பட்ட பகுதிகளை அசையாமல் இருக்கச்செய்யவும் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் என பல நோக்கங்களுக்கு பயன்படுகிறது.

பொதுவானவிதிகள் :

அ) நோயாளிகளுக்கு நம்பிக்கையளித்து என்ன செய்யப் போகிறோம் என்பதை விளக்கவும்

ஆ) பட்டைகள் மற்றும் துணிகள் காயத்திலிருந்து விலகாமல் இருக்கும்படி வலுவாக்கப்பட வேண்டும்.

இ) இரத்த ஓட்டத்தைத் தடுக்காதவாறும், காயத்தை மோசமாக்காத வண்ணம் கட்ட வேண்டும்.

ஈ) விரல்கள் அல்லது நகங்களில் லேசான நீலநிறம் என்பது கட்டினால் இரத்தஓட்டம் பாதிக்கப்படுவதைக் குறிக்கிறது.

உ) உணர்வற்று போதலும் இறுக்கமான கட்டுக்கு அறிகுறியாகும்.

சுருள் கட்டுத் துணியின் வகைகள்

முக்கோணவடிவ கட்டுத்துணி

சுருள் கட்டுத்துணி

குழாய் வடிவகட்டுத்துணி

முக்கோண வடிவ கட்டுத்துணி

இவ்வகையான கட்டு, காயமடைந்த கைகளை தாங்க பயன்படுத்தப்படும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_7.indd 259 22-02-2019 3.43.19 PM