
தட்டையாகவும், முழங்கால் லேசாக மடிக்கப்பட்டு, பாதங்கள் முன்னோக்கி ஒன்றிற்கு ஒன்று இணையாகவும் நான்கு முதல் ஆறு இன்ச் இடைவெளியுடனும் இருக்க வேண்டும்.



2. உட்காரும் நிலை

உட்கார்ந்த நிலையில் முதுகு நேராகவும் உடலின் எடையை சமமாக பிட்டமும், தொடையும் தாங்கும். ஆனால் முதுகெலும்பு தாங்க கூடாது.



நோயாளிக்கு பயன்படுத்தப்படும் நிலைகள்

நிலைகள்

3. மல்லார்ந்த நிலை (*Dorsal position*)

நோயாளி கட்டிலில் மல்லாந்து படுத்திருக்கும் நிலை கால்கள் நீட்டப்பட்டு கைகள் பக்கத்தில் வைத்து இருக்க வேண்டும். இந்நிலையில் உடல் வளைவுகளுக்கு எந்த வித ஆதாரமும் கொடுக்கப்படாததால் இது சௌகரியமற்ற நிலையாகும்.




பயன்கள்

- மார்பு, வயிறு, இருதயம், தலை, கழுத்து மற்றும் கை, கால் அறுவை சிகிச்சையின் போது பயன்படுத்தப்படலாம்.

4. பின் பக்கமாக படுக்கும் நிலை (*Dorsal recumbent position*)

நோயாளியை நேராக மல்லாந்த நிலையில் படுக்க வைத்து தலைக்கு அடியில் தலையணையை வைக்க வேண்டும். இரண்டு கால்களையும் மடக்கி தனித் தனியாக பாதங்கள் படுக்கையில்படுமாறு படுத்தல் நிலையாகும்.



பயன்கள்

- ஆசனவாய், பிறப்புறுப்பு மற்றும் இடுப்புச் சோதனைகள்.
- பிரசவம் போன்றவற்றிற்கு இம்முறை பயன்படுகிறது.

Nursing-Voc_Practical_Tamil_Unit 1-5.indd 331 22-02-2019 4.09.21 PM