நிரந்தர கடினத் தன்மை ஏற்படுகிறது.

வாய்ப்பு (இ) $CaCl_2$

11) சியோலைட் என்பது சோடியம் அலுமினியம் சிலிகேட் ஆகும்.

$(NaAlSi_2O_6 . H_2O)$

வாய்ப்பு (அ)

12) (அ) திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் (STP யில்) 1 mL H_2O_2 ஆனது 100ml O_2 - வை தரும் STP.

13) $Cr_2O_7^{2-} + 2H^+ + 4H_2O_2 \rightarrow 2CrO(O_2)_2 + 5H_2O$

வாய்ப்பு (இ)

14) $2MnO_4^- + 5H_2O_2(aq) + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$

வாய்ப்பு (இ) 5/2

15) ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் கன அளவுச் செறிவு

= ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் நார்மாலிட்டி × 5.6

= 1.5 × 5.6

= 8.4

வாய்ப்பு (ஈ)

$$\underset{(2 \cdot 34g)}{2H_2O_2} \rightarrow 2H_2O + \underset{(22.4 \text{ litres})}{O_2} \uparrow$$

ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் கனஅளவுச் செறிவு

$$= \frac{\text{நார்மாலிட்டி} \times H_2O_2 \text{ன் சமமான நிறை} \times 22.4}{68}$$

$$= \text{நார்மாலிட்டி} \times \frac{17 \times 22.4}{68}$$


ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் கனஅளவுச் செறிவு

= நார்மாலிட்டி× 5.6

16) sp^3 மற்றும் sp^3

வாய்ப்பு (ஈ)

17) ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் அமிலமானது D_2O, உடன் வினைபுரியும் போது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் டியூட்ரியத்தால் பதிலீடு செய்யப்படுகிறது. எனவே இது ஒரு காரத்துவ அமிலம்.




வாய்ப்பு (இ) ஒரு காரத்துவ அமிலம்


18) (அ) 4 ஹைட்ரஜன் அணுக்களால் நான்முகி வடிவில் சூழப்பட்டுள்ளது (படம் 4.6 - பனிக்கட்டியின் வடிவம் பார்க்க)

19) (ஆ)

o-நைட்ரோ பினால்



p - நைட்ரோ பினால்



AllUnitsKey - Sridhar.indd 290 07-01-2021 15:48:47