- A மற்றும் B ஆகியன இரு சார்ந்த நிகழ்வுகள் எனில், நிகழ்வு B ஏற்கனவே நடந்துள்ளபோது, நிகழ்வு A –ன் நிபந்தனைக்குட்பட்ட நிகழ்தகவு,

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) \neq 0$$

- பேயின் தேற்றம் (Baye's Theorem):

S என்ற கூறுவெளியில், ஒன்றை ஒன்று விலக்கும், முழுமையான நிகழ்ச்சிகள் என்க. $E_1, E_2, E_3, ..., E_n$ அதாவது $P(E_i) \neq 0$ $(i = 1,2,3 \ldots, n)$, S –ஐச் சார்ந்த A என்ற ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி $S = \bigcup_{i=1}^{n} E_i$ எனில் $P(A) > 0$,

$$P(E_i / A) = \frac{P(E_i)P(A / E_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(E_i)P(A / E_i)} \; ; \quad i = 1,2,3 \ldots, n \; ;$$

இங்கு $P(A) = P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i)P(A / E_i)$

கலைச் சொற்கள் (GLOSSARY)	
அலைவெண் / நிகழ்வெண்	Frequency
ஒன்றை ஒன்று விலக்கும் நிகழ்வுகள்	Mutually exclusive events/ disjoint events
கால்மான விலக்கம்	Quartile deviation
கால்மானம்	Quartile
கூறுவெளி	Sample space
சம வாய்ப்புள்ள நிகழ்வுகள்	Equally likely events
சமவாய்ப்பு சோதனை	Random experiment
சராசரி விலக்கம்	Mean deviation
சார்பில்லா நிகழ்வுகள்	Independent events
சார்பு நிகழ்வுகள்	Dependent events
தனித்த தொடர்	Discrete series
தொகுக்கப்பட்ட விவரங்கள்	Grouped data
தொடர்ச்சியான தொடர்	Continuous series
நிகழ்தகவு	Probability
நிபந்தனைக்குட்பட்ட நிகழ்தகவு	Conditional probability
நூற்றுமானம்/ சதமானம்	Percentile
பதின்மானம்	Decile
முகடு	Mode
முழுமையான நிகழ்வுகள்	Exhaustive events
வீச்சு	Range

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 224 20-04-2020 04:53:44 PM