இந்தியாவில் வருடம் முழுவதுமே தொடர்ச்சியாக பருத்தி பயிரிடப்படுகிறது (படம் 2.6).



படம் 2.6 பருத்தி வளர்ச்சி

2.2.3 பருத்தி பயிரிடுதலும் அறுவடையும் (Cotton Cultivation and Harvesting)

மண்

பருத்தி வளர்ச்சிக்குக் களிமண் மற்றும் செம்மண் ஏற்றது.

சூழ்நிலை

வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் உள்ள தட்பவெப்ப நிலை தேவை. விதைக்கும் சமயம் தொடர்ந்து மழை இருக்கவேண்டும். அதுவே விதை விரைவில் முளைக்க உதவுகிறது. செடி வளரும் சமயத்தில் நல்ல சூரிய வெளிச்சமும் சீரான வெப்ப நிலையும் இருக்க வேண்டும்.

விதைக்கும் காலம்

ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் விதைக்கலாம். இதன் முழு வளர்ச்சிக் காலம் 120-180 நாட்கள்.

விதைக்கும் முறை

முதலில்நிலத்தைநன்குஉழுதுகாற்றுப்புகுமாறுசெய்ய வேண்டும். 1-15 மீட்டர் இடைவெளி இருக்குமாறு பாத்திகள் அமைத்து விதைக்கப்படுகின்றன. 10-14 நாட்களில் விதைகள் முளைக்கும். பிறகு வேகமாக வளர ஆரம்பிக்கும். சமமான இடைவெளியில் உறுதியான செடிகளை மட்டுமே வளர விட வேண்டும். அப்பொழுது தான் அதிக மகசூல் பெறமுடியும். 2 அல்லது 3 மாதங்களில் பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிக்கும். பின் பச்சை பந்து போன்ற காய்கள் வளர ஆரம்பிக்கும். இதில் பருத்தி விதைகள் இருக்கும். இந்த விதைகளின் வெளிப்புறத்திலிருந்து பருத்தி இழைகள் வளர ஆரம்பிக்கின்றன. பிறகு முதிர்ந்த பருத்திக்காய் வெடித்து பருத்தி இழை வெளியே வருகிறது.

அறுவடை செய்தல்

பருத்திக்காய் வெடித்தவுடன் உடனடியாக சேகரிக்கப்பட வேண்டும். அப்படிச் செய்யவில்லை என்றால்பருத்திஇழைவிதையுடன்காற்றில்அடித்துச் சென்று விடும். மேலும் வெளிப்புறத்திலிருந்து தூசுகள் இழைகள் மேல் படிந்து நிறம் மங்கும். பருத்தி மனிதர்கள் மூலமாகவோ அல்லது இயந்திரங்கள் மூலமாகவோ பறிக்கப்படுகிறது. பிறகு பறிக்கப்பட்ட பருத்தி இழைகள் ஜின்னிங் மில்லுக்கு அனுப்பப்படுகிறது (படம் 2.7).



படம் 2.7 பருத்தி பயிரிடுதலும் அறுவடையும்

ஜின்னிங்

அறுவடை செய்யப்பட்ட இழைகளை மிதமான வெப்பத்தில் உலர வைத்து ஜின்னிங் செய்ய சேமிக்கப்படுகிறது. விதைகளை நீக்கி இழையைப் பிரித்தெடுப்பதற்கு ஜின்னிங் என்று பெயர். சிறப்பு இயந்திரங்கள் மூலமாக விதைகள் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இழைகளை லின்ட் என்கிறார்கள். இதை 15 மி.மீ. முதல் 50 மி.மீ. வரை நீளம் இருக்கும். மிகவும் நீளம் குறைவாக இருக்கும் இழைகளை லிண்டர்ஸ் என்று அழைக்கிறார்கள்.

100 கிலோ பருத்தியில் 35 கிலோ நார் 62 கிலோ விதைகள் 3 கிலோ தேவையற்றவைகள் கிடைக்கின்றன.இந்த இழைகளை 500 கிலோவில் தனித்தனியாக மூட்டைகளாக கட்டி ஸ்பின்னிங் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு நூல் தயாரிக்கப்படுகிறது.

2.2.4 பருத்தியின் பௌதீக பண்புகள்

இழையின் பளபளப்பு	குறைவாக உள்ளது.
இழையின் உற்பத்தி	நடுத்தரமாக உள்ளது.

TDD_Tamil_Chapter02.indd 12 30-01-2019 12:05:21