- $(x, f(x))$ என்ற புள்ளியில் $y = f(x)$ -ன் வகைக்கெழு $y = f(x)$ என்ற வளைவரையில் தொடுகோட்டின் சாய்வு என்பதன் வடிவியல் விளக்கமாகும்.
- $s = f(t)$ -ன் முதல் வகைக்கெழு t-ஐ பொறுத்து இடமாற்றத்தின் மாறு வீதமாகும். அது திசைவேகம் ஆகும். இரண்டாம் வகைக்கெழு முடுக்கமாகும். மூன்றாவது வகைக்கெழு குலுக்கமாகும்.
- $x = x_0$ -ல் $y = f(x)$ தொடர்ச்சியற்று இருந்தால் $x = x_0$ -ல் $f(x)$ வகைமையற்றது.
- $x = x_0$ -ல் $y = f(x)$ வகைமை இல்லையெனில் $(x_0, f(x_0))$ -ல் $y = f(x)$ என்றவளைவரைக்குத் தொடுகோடு இல்லை என்பதாக பொருள்.
- $y = f(x)$ என்ற வளைவரைக்கு $x = x_0$ -ல் வளைவரை வடிவம் $(\vee)$ அல்லது $(\wedge)$ வடிவில் இருந்தால் $x = x_0$ -ல் வகைமை இல்லை.
- வகையிடல் என்பது ஒரு செயலே அன்றி விதிகளின் தொகுப்பு எனப் புரிந்து கொள்ளல்.
- வகைமைத் தன்மையானது தொடர்ச்சித் தன்மையைக் கொடுக்கும். ஆனால் தொடர்ச்சித்தன்மையானது வகைமைத்தன்மையைக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
- வகைமைத்தன்மை வாய்ந்த சார்புகளின் வேறுபாடு, பெருக்கல், வகுத்தல்

(i) $\dfrac{d}{dx}(f(x) \pm g(x)) = \dfrac{d}{dx} f(x) \pm \dfrac{d}{dx} g(x)$

(ii) $\dfrac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f(x)\dfrac{dg}{dx} + g(x)\dfrac{df}{dx}$

(iii) $\dfrac{d}{dx}((fog)(x)) = f'(g(x))g'(x)$

(iv) $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right) = \dfrac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ இங்கு $g(x) \neq 0$ ஆகும்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 191 25-03-2019 13:39:55