அட்டவணை 6.2 ஊறுகாய் கெடும் விதங்கள்

வ. எண்.	கெடுதலின் விதம்	கெடுதலுக்கான காரணங்கள்	தடுக்கும் விதம்
9.	பூஞ்சைக் காளான் வளருதல் (Mould growth)	போதுமான அளவு உப்பு, மசாலா, எண்ணெய் இல்லாமை, பிளான்ச்சிங் செய்த பிறகு அதிலுள்ள ஈரப்பதத்தினை சரிவர நீக்காமல் இருத்தல், ஜாடிகள் சரியாக சுத்திகரிக்கப்படாமை, ஊறுகாய் ஜாடிகள் ஈரப்பதமுள்ள இடங்களில் சேமித்து வைத்தல்	• போதுமான அளவு உப்பு, மசாலா, எண்ணெய் பயன்படுத்துதல் • பிளான்ச்சிங் செய்த காய்கறிகள் / பழங்களைச் சூரிய ஒளியில் வைத்து ஈரப்பதம் நீங்கச் செய்தல் • உலர்ந்த ஜாடியில் குளிர்ந்த நிலையில் சேமித்தல் • நிரப்பப்பட்ட ஊறுகாயின் மேற்பரப்பிற்கு மேல் 2 அங்குல உயரத்திற்கு எண்ணெய் இருக்கச் செய்தல்
10.	தெளிவில்லாத மங்கலான நிறம் (Dull and faded colour)	அதிகம் முதிர்ச்சியடைந்த தரமில்லாத காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களைத் தவிர்த்தல்	வெட்டுபடாமல், சரியான முதிர்வுடன் காயங்கள் இல்லாமல் நேர்த்தியான காய்கறிகள், பழங்களைப் பயன்படுத்துதல்

III. ஊறுகாய் கெடும் விதங்கள்

ஊறுகாய் கெடும் விதங்கள் அட்டவணை 6.2ல் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

6.4 நொதித்தல்

நொதித்தல் என்பது பழமையான உணவு பதப்படுத்தும் முறையாகும். உணவு உப்பிடுதல், உலரவைத்தல் போன்றே நொதித்தலும் உணவுப் பொருட்களின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்கும். காற்று, காற்றற்ற சூழ்நிலையில் கார்போஹைட்ரேட், அதனைச் சார்ந்த பொருட்களைச் சிதைப்பதே நொதித்தல் எனப்படும். நொதித்தல் இயற்கை சூழ்நிலையில் நுண்ணுயிரிகளும் கரிமக் கூட்டுப் பொருட்களும் ஒன்றோடொன்று இணைந்து வினை புரிதலால் ஏற்படும் செயலாகும். கார்போஹைட்ரேட் தவிர புரதம் மற்றும் கொழுப்பின் மீது நுண்ணுயிரிகளும் நொதிப் பொருட்களும் வினைபுரிந்து கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு, மற்ற வாயுக்களை வெளியிடுகின்றது.

(1) காற்றற்ற சூழ்நிலை – பாலாடைக் கட்டி தயாரிப்பில் ஸ்ட்ரெப்டோ-காக்கஸ் லாக்டிஸ் பாக்டீரியா, காற்றற்ற சூழ்நிலையில் லாக்டோஸை லாக்டிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றது.

(2) காற்றுள்ள சூழ்நிலை – வினிகர் தயாரிப்பில் அசிட்டோ பேக்டர் பாக்டீரியா ஈதைல் ஆல்கஹாலை அசிட்டிக் அமிலமாக காற்றுள்ள சூழ்நிலையில் ஆக்ஸிகரணத்தின் மூலமாக மாற்றுகிறது.

நொதித்தல் மூலம் தயாரிக்கப்படும் உணவுகள்

1. ஆல்கஹால் நிறைந்த பானங்கள்

- ஓயின் (Wine): திராட்சைத் தோலின் மேல் பகுதியில் ஈஸ்ட் காணப்படுகிறது. இந்த ஈஸ்ட்டானது திராட்சையிலுள்ள சர்க்கரைகள் மீது வினைபுரிந்து அவற்றை ஆல்கஹாலாக மாற்றும் போது நொதித்தல் செயல் ஆரம்பிக்கின்றது.
- பீர் மற்றும் ஏல் (Beer and Ale): ஈஸ்ட்டானது மால்ட் தானியங்களை நொதிக்கச் செய்து 3 முதல் 7 சதவீதம் ஆல்கஹாலினை உற்பத்திச் செய்கின்றது. ஆல்கஹாலின் உற்பத்தி ஈஸ்ட்டின் வகை, அதன் அளவு நொதித்தலின்

06_FSM_Theory_Tamil_Ch6.indd 94 20-02-2019 6.39.22 PM