

▲ புகைப்படம் 8.4 ராக்ஃபோர்ட் சீஸ்

ii. பாலாடைக்கட்டி (Cheese): பாலில் உள்ள கேசின் என்ற புரதம் உறையும்போது தயிராகிறது. கெட்டியான பாலாடை கட்டி அதிலுள்ள அனைத்து நீரினையும் வெளியேற்றுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது (எ.கா) செடார் சீஸ் (Cheddar Cheese), ஸ்விஸ் சீஸ் (Swiss Cheese). மேலும் ஸ்டைஃபைலோ காக்கஸ் லாக்டிஸ் (Stephylococcus Lactis), ஸ்டைஃபைலோ காக்கஸ் க்ரிமோரிஸ் (Stephylococcus Cremoris) போன்ற நுண்ணுயிரிகள் சீஸ் உருவாவதற்குப் பயன்படுகின்றன.

பென்சீலியம் கேமம்பெர்ட்டி (Pencillium Camemberti), பென்சீலியம் ராக்ஃபோர்ட்டி (Pencillium Roqueforti) என்ற பூஞ்சை கேமம்பெர்ட் (Camembert) மற்றும் ராக்ஃபோர்ட் சீஸ் (Roquefort Cheese) தயாரிக்க உதவுகிறது. மேலும் தயிர், யோகர்ட், கியுமிஸ், லெபன் மற்றும் கெஃபீர் போன்ற பதப்படுத்தப்பட்ட பால்பொருள்கள் அனைத்தும் பாலிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் செயலால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

8.2 உணவு கெடுதல்

8.2.1 வரையறை

உணவு கெடுதல் என்பது பல்வேறு நுண்ணுயிரிகளின் தாக்குதலால் உணவு சிதைந்து உண்ணத் தகுதியற்றதாக மாறுவதே ஆகும்.

கெடுதல் என்னும் சொல் உடலுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் உண்ணத்தகுதியற்ற உணவினைக் குறிப்பதாகும்.

UTUDS2

கெட்டுப் போன உணவுப் பொருட்களை அதன் நிறம், வாசனை, சுவை போன்றவற்றால் கண்டறியலாம்.

உணவு தொற்று என்பது சுத்தமில்லாத உண்ணத்தகுதியற்ற உணவினால் ஏற்படுகிறது. இவை பார்ப்பதற்கு நன்றாகவும், சுவையாகவும், நல்ல மணமுடன் காணப்பட்டாலும் தீங்கு விளைவிக்கும் வேதிப்பொருட்களும், உண்ணத் தகாதப்பொருட்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

8.2.2 உணவு கெடுவதற்கான காரணங்கள்

உணவானது காற்று, நீர், தாவரம், மண், உணவினைக் கையாள்பவர், இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள், கழிவு நீர் மற்றும் டிரக்குகள் அல்லது வண்டி மூலம் இடம் பெயர்தல் போன்ற காரணங்களால் கெட்டுப் போக வாய்ப்புள்ளது. உணவானது பின்வரும் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது அதற்கும் மேலான காரணங்களால் கெட்டுப்போகிறது.



▲ புகைப்படம் 8.5 சிதைந்த தக்காளி

08_FSM_Theory_Tamil_Ch8.indd 119 20-02-2019 6.40.49 PM