அதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மாவு, ரவை, பொரி மற்றும் பாப்கார்ன் போன்றவை குறிப்பிட்ட காலம் வரை கெடாமல் இருக்கும். இவைகளின் ஆயுட்கால அளவு அவை வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தின் வெப்பநிலை, ஈரப்பதத்தினைப் பொருத்து அமையும் மற்ற உணவுப் பொருட்களான உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், கொட்டை வகைகள், உறைய வைக்கப்பட்ட உணவுகள், டப்பாக்களில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட உணவுகள் ஒரு வாரத்திற்கோ அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கோ அறை வெப்பநிலையில் இருக்கும்போது எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படாது.

3. **விரைவாக அழுகும் உணவுகள்** அன்றாடம் உபயோகப்படுத்தும் உணவுகளான பால்பொருள்கள், முட்டை, கோழி இறைச்சி, மாமிசம், மீன், பழம் மற்றும் காய்கறிகள் போன்றவை அவற்றில் இயற்கையான நொதிகளின் மூலமே விரைவாக வீணாகிவிடும்.



▲ புகைப்படம் 8.7 விரைவாக அழுகும் உணவுகள்

8.2.4 உணவு கெடுவதற்கான அறிகுறிகள்

உணவு கெடுதலின் அறிகுறியானது, உணவின் வகைகளைப் பொறுத்தும், சுற்றுப்புற சூழல், அதன் காரணிகளைப் பொறுத்தும் அமைகிறது.

அறிகுறிகள்: பொதுவாக மிருதுத்தன்மை, கடினத்தன்மை, நிறம்மாறுபடுதல், பூஞ்சை வளர்ச்சி, நொதித்தல், உலர்தல், ஊசிப்போதல் மற்றும் நீர்வடிதல், துர்நாற்றம், பூஞ்சை வளர்ச்சி, புளித்துப் போதல் மற்றும் புழு பூச்சி உண்டாதல் ஆகியவையாகும்.

வெவ்வேறு உணவு வகைகளின் கெடுதல் அறிகுறிகளைப் பின்வரும் வழிகளில் கண்டறியலாம்.

1. **தானியம் மற்றும் பயறு வகைகள்:** இவை எளிதாக கெட்டுப்போகாவிட்டாலும், பின்வரும் அறிகுறிகளை வைத்துக் கெடுவதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

- கெட்டுப்போன வாடை, சுவையற்ற நிலை
- வண்டுகள், பூச்சிகள் மற்றும் புழுக்கள் இருத்தல்.
- தானியம் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் கொள்ளுதல்
- அழுக்கு, தூசு, மண் மற்றும் கற்கள் இருத்தல்.

2. **காய்கறிகள் மற்றும் பழவகைகள்:** உணவு வீணாவதன் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு –

- பூஞ்சை பிடித்து அழுகிப்போதல்
- கீரை வகைகளில் வாடுதல், இலைகள் உதிர்தல், இலைகளின் மேல் சுண்ணாம்பு பூச்சு காணப்படுதல்.
- நிற மாற்றம் மற்றும் கொழ கொழப்பு தன்மை.
- பூச்சி மற்றும் புழுக்கள் காணப்படுதல்
- பச்சை நிற உருளை, முளைத்த உருளை, மேலும் முற்றிப்போன காய்கறிகள்
- மேல் தோல் பகுதி பாதிப்படைதல் மற்றும் காயமடைந்து காணப்படுதல்.



▲ புகைப்படம் 8.8 பூஞ்சை பிடித்த கேரட்

08_FSM_Theory_Tamil_Ch8.indd 121 20-02-2019 6.40.51 PM