13. The value of $\int_0^{\pi} \sin^4 x \, dx$ is

(1) $\frac{3\pi}{10}$ (2) $\frac{3\pi}{8}$ (3) $\frac{3\pi}{4}$ (4) $\frac{3\pi}{2}$

14. The value of $\int_0^{\infty} e^{-3x} x^2 dx$ is

(1) $\frac{7}{27}$ (2) $\frac{5}{27}$ (3) $\frac{4}{27}$ (4) $\frac{2}{27}$

15. If $\int_0^a \frac{1}{4+x^2} dx = \frac{\pi}{8}$ then a is

(1) 4 (2) 1 (3) 3 (4) 2

16. The volume of solid of revolution of the region bounded by $y^2 = x(a-x)$ about x-axis is

(1) πa^3 (2) $\frac{\pi a^3}{4}$ (3) $\frac{\pi a^3}{5}$ (4) $\frac{\pi a^3}{6}$

17. If $f(x) = \int_1^x \frac{e^{\sin u}}{u} du, x > 1$ and

$\int_1^3 \frac{e^{\sin x^2}}{x} dx = \frac{1}{2}[f(a) - f(1)]$, then one of the possible value of a is

(1) 3 (2) 6 (3) 9 (5)

18. The value of $\int_0^1 \left(\sin^{-1} x\right)^2 dx$ is

(1) $\frac{\pi^2}{4} - 1$ (2) $\frac{\pi^2}{4} + 2$ (3) $\frac{\pi^2}{4} + 1$ (4) $\frac{\pi^2}{4} - 2$

19. The value of $\int_0^a \left(\sqrt{a^2 - x^2}\right)^3 dx$ is

(1) $\frac{\pi a^3}{16}$ (2) $\frac{3\pi a^4}{16}$ (3) $\frac{3\pi a^2}{8}$ (4) $\frac{3\pi a^4}{8}$

20. If $\int_0^x f(t)\,dt = x + \int_x^1 tf(t)\,dt$, then the value of $f(1)$ is

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 2 (3) 1 (4) $\frac{3}{4}$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 141 17-02-2020 17:08:49