**செய்முறை**

- அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்ட நீண்ட உருளை வடிவ கண்ணாடி ஜாடி ஒன்றினை எடுத்து அதனுள் கொடுக்கப்பட்ட திரவத்தை நிரப்பவேண்டும்.
- A,B என்ற இரு புள்ளிகள் கண்ணாடி ஜாடியில் குறிக்கப்படுகிறது. உலோகக் குண்டானது Aயை அடையும்போது அது முற்றுத் திசைவேகத்தைப் பெறும் வகையில் புள்ளி A திரவத்தின் பரப்பிற்கு அதிக ஆழத்தில் குறிக்கப்படவேண்டும்.
- திருகு அளவி கொண்டு, கோளவடிவ உலோகக்குண்டின் ஆரத்தைக் கணக்கிட வேண்டும்.
- கோளவடிவக்குண்டாது திரவத்தில் மெதுவாக விழச்செய்யப்பட வேண்டும்.
- கோளமானது புள்ளி A–யை கடக்கும் போது ஓர் நிறுத்துக்கடிகாரத்தை இயக்கவேண்டும். கோளமானது புள்ளி B–யை கடக்கும் போது நிறுத்துக் கடிகாரத்தை நிறுத்த வேண்டும். A மற்றும் B –க்கு இடையேயான தொலைவை அளந்து t மதிப்பை அட்டவணையில் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- A மற்றும் B–க்கு இடையேயான தொலைவினை அளந்து கொள்ள வேண்டும். வெவ்வேறு தொலைவுகளுக்கு சோதனை திரும்பச் செய்யப்படவேண்டும். புள்ளி Aயானது கண்டிப்பாக முற்றுத்திசைவேகத்தை அடையும் நிலைக்கு கீழே குறிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

**காட்சிப்பதிவுகள்**

முற்றுத் திசைவேகத்தைக் காணல்

| வ. எண். | கோளவடிவக் குண்டு கடந்த தொலைவு (d) m | எடுத்துக்கொண்ட காலம் (t) (s) | முற்றுத்திசைவேகம் (V) $d/t$ (m $s^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **சராசரி=** | |

**கணக்கீடு**

கோளவடிவ உலோகக் குண்டின் அடர்த்தி δ = _____ $kg\,m^{-3}$

கொடுக்கப்பட்ட திரவத்தின் அடர்த்தி σ = _____ $kg\,m^{-3}$

கோளத்தின் ஆரம் r_____ m

திரவத்தின் பாகியல் எண் $\eta = \frac{2r^2 g(\delta - \sigma)}{9V}$ = _____ N s $m^{-2}$

**முடிவு**

ஸ்டோக்ஸ் முறையில் கொடுக்கப்பட்ட திரவத்தின் பாகியல் எண் η = _____ N s $m^{-2}$



UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 304 25-08-2020 11:40:07