இயற்பியலில் சில முக்கியமான மாறிலிகள்

(Some important constants in physics)

பெயர்	குறியீடு	மதிப்பு
வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகம்	c	$2.9979 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
ஈர்ப்பியல் மாறிலி	G	$6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^{2}\ \text{kg}^{-2}$
புவிஈர்ப்புமுடுக்கம் (கடல் மட்டத்தில் 45° குறுக்குக் கோட்டில்)	g	$9.8\ \text{m s}^{-2}$
பிளாங்க் மாறிலி	h	$6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி	k	$1.38 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
அவகட்ரோ எண்	N_A	$6.023 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
பொது வாயு மாறிலி	R	$8.31\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$
ஸ்டீபன் – போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி	σ	$5.67 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\ \text{K}^{-4}$
வியனின் மாறிலி (Wien's constant)	b	$2.898 \times 10^{-3}\ \text{m K}$
வெற்றிடத்தின் உட்புகு திறன்	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}\ \text{H m}^{-1}$
படித்தர வளிமண்டல அழுத்தம்	$1\,atm$	$1.013 \times 10^{5}\ \text{Pa}$

தீர்க்கப்பட்டகணக்குகள்

KH8EXD

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 316 25-08-2020 11:40:13