காணப்படுகின்றன. அவை பிலியோமார்பிக் தன்மை கொண்டவைகள் ஆகும்.

- செல் பிரிதலின் தளத்தையும், செல் பிரிதலுக்கு பின்பு சேய் செல்கள் தாய் செல்களுடன் ஒன்றினைந்து இருக்கின்றனவா என்பதனையும் அடிப்படையாக கொண்டு காக்கை செல்கள் பல்வேறு வகையான ஒழுங்கு வரிசையில் காணப்படுகின்றன. செல்கள் இரட்டையாகவோ (டிப்ளோகாக்கை), நான்கு செல்கள் கொண்ட குழுவாகவோ (டெட்ரா காக்கை), கொத்தாகவோ (*ஸ்டைப்லோகாக்கை*), முத்து போன்ற சங்கிலி அமைப்பாகவோ (*ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை*), கனச்சதுரமாகவோ (*சர்சினே*) காணப்படலாம்.
- குச்சி போன்ற வடிவமுடைய உயிரிகள் பேசில்லைகள் ஆகும். இவை 1 –10 μm நீளம் கொண்டவை. சில பேசில்லைகள் மிக குட்டையாகவும், கட்டையாகவும் உள்ளதால், அவை நீளவட்ட வடிவமாய் காட்சியளிக்கின்றன. இவை காக்கோ பேசில்லஸ் என குறிப்பிடபடுகின்றன. பெரும்பான்மையான காக்கைகள் பேசில்லைகளை போன்று சிக்கலான வடிவ அமைப்புகள் இல்லாமல் ஒற்றையாகவோ, இரட்டையாகவோ (*பேசில்லஸ் சப்ஸ்டில்லிஸ்*), சங்கிலி போன்ற வடிவமைப்பிலோ (*ஸ்டெரப்டோ பேசில்லை*) காணப்படுகின்றன. சில, பாக்டீரியாக்கள் சங்கிலி போன்ற டிரைக்கோம்களை உருவாக்குகின்றன. *காரினிபேக்டீரியம் டிப்தீரியேவின்* செல்கள் ஒன்றுக் கொன்று தீக்குச்சி போல் அருகில் இருப்பது பாலிசேட் அமைப்பாகும். சில *பேசில்லை* வளைந்து கால்புள்ளியை போல் காணப்படுகின்றன. இவை விப்ரியோஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன (எடுத்துக்காட்டு: *விப்ரியோ காலரே*).

சுருள் பாக்டீரியா (Spiral bacteria)

இவை, ஸ்பைரில்லம், ஸ்பைரோகீட் என இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. உருவ அமைபில் ஒன்றாக இருந்தாலும்,ஸ்பைரேகிட்டுகள் வளையக்கூடிய தன்மை கொண்டவை சுருள் பாக்டீரியா. பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கியினால் காணமுடியாத அளவிற்கு மிகவும் மெலிந்தவை. ஆனால் அதனை, டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கினால் உடனடியாக பார்க்க முடியும் (படம் 7.3).

இழை பாக்டீரியா (Filamentous bacteria)

இழை பாக்டீரியாவின் பல செல்களை கொண்டிருக்கும் நீண்ட இழைகள், துண்டுகளாக்கப்படும் போது ஒற்றை செல்கள் காணப்படலாம். இவை பூஞ்சைகளின் இழை போன்று ஒத்திருந்தாலும் உள்ளமைப்புகளில் பொதுவான பாக்டீரியாகளை போல் இருக்கின்றன. மண்ணில் உள்ள இழை பாக்டீரியா, *ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ்* சிற்றினம் போன்றவைகளை உள்ளடக்கியுள்ளன.

பிலியோமார்பிக் பாக்டீரியா (Pleomorphic bacteria)

ஒரு சில பாக்டீரியக்கள், கடினமான செல் சுவர்கள் அற்றவை. இவற்றின் வளையத்தக்க பிளாஸ்மா சவ்வு இவைகளின் வடிவத்தை மாற்றுவதற்கு இடமளிக்கின்றது (பிலியோ – அதிகம்; மார்ப் – உருவம்) எடுத்துக்காட்டு: *மைக்கோபிளாஸ்மா.*

7.2 பாக்டீரியாவின் செல்சுவருக்கு வெளியே உள்ள அமைப்புகள்

7.2.1 துணையுறுப்புகள்

கசையிழை (Flagella)

கசையிழை என்பது நூல் போன்ற நீளமான, மெல்லிய சுருள் இழைகள் ஆகும். இது 0.01–0.02nm விட்டம் கொண்டது. இவை பிளாஸ்மா சவ்வு மற்றும் செல்சுவரிலிருந்து வெளியே நீட்டி கொண்டுருக்கும் இணையுறுப்புகள் ஆகும். கசையிழை மிகவும் மெல்லியதாக இருப்பதால் ஒளி நுண்ணோக்கி மூலம் நேரடியாகப் பார்க்க இயலாது. சிறப்பு சாயமேற்று முறையான போன்டானாஸ் வெள்ளி சாயமேற்றுமுறையைப் பயன்படுத்தி, அதனுடைய தடிமனை அதிகரித்துப் பார்க்கலாம். கசையிழையின் விரிவான அமைப்பை எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினால் மட்டுமே காண முடியும். பாக்டீரியாவின் கசையிழை மூன்று பகுதிகளை கொண்டது.அவைஅடிப்பாகம்(பிளாஸ்மாசவ்வையும் செல்சுவரையும் தொடர்புடையதாய் இருக்கும்), சிறிய கொக்கி, சுருள் இழை (செல்லை விட பலமடங்கு நீளமாக இருக்கும்) ஆகும். சுருள் இழையானது செல்சுவருக்கு வெளியேயும், கொக்கியுடனும் செல்லின் மேற்புரத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை கொக்கியிலும் அடிப்பகுதி செல்லின் மேலுறையிலும் பதிக்கப்பட்டு இருக்கும் (படம் 7.4). கொக்கியும் சுருள் இழையும் பிளாஜிலின் என்ற புரத துணை அலகுகளைக் கொண்டுள்ளன.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 93 19-02-2019 5.48.45 PM