
8.2 இருசொற் பெயரிடும் முறை (Binomial nomenclature)

சுவீடன் நாட்டு தாவரவியல் அறிஞர் கரோலஸ் லின்னேயஸ் 1735–ம் ஆண்டு உயிரினங்களை வகைப்படுத்தும் முறையினை அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் உயிரினங்களை தாவர உலகம், விலங்கு உலகம் என இரண்டு உலகங்களாக பிரித்தார். இருசொற் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். உயிரினங்களின் முதல் பெயர் பேரினம் எனவும், இரண்டாவது பெயர் சிற்றினம் எனவும் கூறினார். ஒரு உயிரினத்தின் பெயர் என்பது அவ்வுயிரியின் தனித்துவமான பண்புகளைக் குறிப்பதாகும். வகைப்பாட்டியல் அலகு (அடிப்படை வகைப்பாட்டியல் தொகுப்பு) சிறு சிற்றினங்களால் உருவாக்கப்பட்டது. அவையானது, ஆரம்ப வளர்ப்பில் இருந்து அடுத்து அடுத்து பெறப்பட்ட குழு ஆகும். வகைப்பாட்டியலில் அடிப்படை அலகு சிற்றினம் (Species) ஆகும். இவை ஒரே பண்புகளைக் கொண்ட உயிரிகளின் தொகுப்பு ஆகும். வகை சிற்றினங்கள் (Type strain) என்பது ஒரு சிறப்பான பாக்டீரியல் இனம் ஆகும். மற்ற இனங்களை ஒப்பீடு செய்வதற்குக்காக நிரந்தரமாக பயன்படும் சிற்றினம் வகை சிற்றினங்கள் ஆகும் (படம் 8.2).

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

ஏன் வகை சிறுசிற்றினங்கள், பாக்டீரியல் சிற்றினங்களில் மிக முக்கியமான சிறுசிற்றினமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன?

ஒரு சிற்றினத்திலுள்ள இரு வேறு சிறுசிற்றினத்திற்கு (Strain) இடையேயான உடலியல், உயிரியல் அமைப்புகளின் வேறுபாடுகளை குறிப்பது "பயோவார்" எனப்படும். ஒரு சிற்றினத்தில் உள்ள ஒரு பயோவார் சுக்ரோஸில் வளரும் தன்மை கொண்டதாகவும், மற்றொன்று வளராத தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது. பயோவார்கள் அனைத்து பண்புகளிலும் ஒத்திருந்து ஒரே ஒரு பண்பால் வேறுபட்டு இருந்தாலும் கூட அவை அனைத்தும் ஒரே பேரினத்திலும், ஒரே சிற்றினத்திலும் உள்ளடங்கியிருக்கும். (அவை உயிரியல் வளர்ச்சி பண்புகளில் வேறுபட்டு இருந்தாலும் கூட) சிறு சிற்றினங்களுக்கு இடையேயான உருவ அமைப்பு மாறுபாடுகள் மார்போவார் (Morphovar) அல்லது மார்போ வகைகள் எனப்படும். சிறு சிற்றினங்களில் ஆண்டிஜெனிக் பண்புகள் வேறுபட்டு காணப்பட்டால் அவை சீரோவார் (Serovar) அல்லது சீரோ டைப் எனப்படும். இது சிற்றினத்தில் உள்ள நோய்த்தடுப்பியலின் வேறுபாடுகளைக் குறிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாடு: *சால்மோனெல்லாவின்* வேறுபட்ட சீரோவார். *சால்மோனெல்லா* செல்லின் மேற்புரத்தில் காணப்படும் மாறுதல்களால், ஒரு சீரோவர் மற்றொரு சீரோவார் அமைப்பிலிருந்து வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. இந்த மேற்பரப்பிலுள்ள மாறுபாட்டின் காரணமாக ஒரு சீரோவருக்கு எதிர்ப்பு சக்தியுள்ள ஒரு நபர் இரண்டாவது சீரோவாரால் பாதிக்கப்படுகிறார். ஏனெனில், அந்நபரின் எதிர்ப்புச் சக்தி மண்டலத்தால், ஒரே மாதிரியான பாக்டீரியத்தின் புதிய மேற்பரப்புடைய சீரோவாரை அறிந்துக் கொள்ள முடிவதில்லை.



படம் 8.2: நுண்ணுயிர் வகைப்பாட்டு படிநிலைக்கான எடுத்துக்காட்டு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 115 19-02-2019 5.49.41 PM