மறுசீரமைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் சேர்மங்கள் இறுதி நிலையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உரமாக்கும் செயல்முறையில் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை.

- பூச்சிகளை ஈர்க்கும் கழிவுகள்
- நோயுற்ற/பூச்சிகள் நிறைந்த தாவரங்கள்
- மீளுருவாக்கம் செய்ய முடியாதவை.



சிதைவு நிகழ்வின்போது சிதைவு அமிலங்களின் அளவு 4–12% வரையும் அதிகரித்தும் மற்றும் C/N (கார்பன்/நைட்ரஜன்) விகிதம் 30 லிருந்து 10% குறைந்தும் காணப்படும்.

கலப்பு உரம் படுக்கை வகைகள்

1. குழி முறை
2. குவியல் முறை

குழி முறை


மண்ணில் உரக்குழிகள், 3.5மீ × 2.5மீ × 1.5மீ (L×B×H) என்ற பரிமாணத்துடன் தோண்டப்படும் பச்சை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் கழிவுகள் குழி நிரப்பப்படும் வரை பல அடுக்குகளாக நிரப்பப்பட்டு, இறுதியாக மண் குவியலால் மூடப்படுகிறது (படம் 9.12).



படம் 9.12: குழி முறை

குவியல் முறை

அதிக மழைப்பொழிவு கொண்ட பகுதிகளில் குழிகள் தரையின் மேல்மட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டு கொட்டகை போன்ற அமைப்பினால் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. இக்குவியலானது



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 142 19-02-2019 5.50.25 PM