அட்டவணை 13.1: நோய்த் தடுப்பியலுக்கு அறிஞர்கள் ஆற்றியப் பங்கு

வருடம்	அறிஞர்கள் பெயர்	நோய்த் தடுப்பியலுக்கு ஆற்றிய பங்கு
1796	எட்வர்ட் ஜென்னர்	பெரியம்மைக்கு எதிராக பசு அம்மை அல்லது வேக்சீனியா பாதுகாப்பை தூண்டுவதாக கண்டுப்பிடித்தார்.
தாதுக்களைச் சார்ந்த மற்றும் செல்கள் சார்ந்த நோய்த்தடுப்பாற்றலின் கண்டுபிடிப்புகள்		
1890	வான் பெர்ரிங் மற்றும் கிட்டஸ்டோ (வான் பெர்ரிங் 1901ல் மருத்துவ துறையில் நோபல் பரிசு பெற்றார்).	நோய்த்தடுப்பாற்றலின் இயக்கமுறைப் பற்றி ஆழ்ந்த அறிவனை வழங்கினார்.
1930's	காபட்	சீரத்தில் ஒரு பகுதியான காமாகுளோபுலின் (தற்பொழுது இம்யூனோகுளோபிலின்) நோய்த்தடுப்பு ஆற்றலில் செயல்மிகு பகுதியாக உள்ளது என்பதனை காண்பித்தார்.
1883	எலிமெட்சினிகாஃப்	அந்நிய பொருள்களையும் பிற நுண்ணுயிரிகளையும் விழுங்கும் சில வெள்ளை இரத்த அணுக்களை கண்டறிந்து அவற்றை போகோசைட்கள் என்று கூறினார்.
1903	சர் அல்மொத் ரைட்	செல் விழுங்குதலில் ஆன்டிபாடிகள் உதவுகின்றன என தெரிவித்தார். அவர் இந்த ஆன்டிபாடியை "ஆப்சோனின்" என்று அழைத்தார்.
1996	கிளாமன், சேப்ரன் மற்றும் டிரிப்லட்	B செல்கள் T செல்கள் இருப்பதையும் மற்றும் இரண்டிற்கிடையேயான கூட்டுறவையும் கண்டறிந்தார்.
நோய் எதிர்ப்புத்திறனின் தனித்தன்மை		
ஏறத்தாழ 1900ல்	ஜீல்ஸ் போர்டெட்	நோய் உண்டாக்காத பொருள்களான பிற சிற்றினத்தின் இரத்த சிவப்பு செல்கள் ஆன்டிஜென்னாக வேலை செய்ய முடியும் என செயல்முறை விளக்கம் அளித்தார்.
	கார்ல் லேண்ட்ஸ்டெய்னர்	ஒரு விலங்கில் தன்னிலை அற்ற (Non–Self), கனிம வேதிபொருளை உட்செலுத்தும்போது அப்பொருளுக்கு எதிரான தனித்தன்மையுடைய ஆன்டிபாடி உற்பத்தியாகி அந்த வேதிப்பொருளுடன் இணையும் என காண்பித்தார்.
மூலக்கூறு நோய்த்தடுப்பியல்		
1959	போர்ட்டர்	இம்யுனோகுளோபுலின் துண்டுகளைப் பிரித்தார்.
	எடெல்மேன்	கனமான மற்றும் இலேசான ஆன்டிபாடிகளின் சங்கிலியைப் பிரித்தெடுத்தார்.
1965	புட்னம், ஹில்ச்மேன் மற்றும் கிரைக்	இம்யுனோகுளோபுலின் நிலையான மற்றும் மாறுப்பட்ட பகுதிகளை கண்டுபிடித்தனர்.
1979	குங் மற்றும் பிற அறிஞர்கள்	முதல் மோனோ குளோனல் ஆன்டிபாடி T–செல் துணைக்குழுவை அடையாளம் காணுவதை விவரித்தார்.
1982–83	அல்லிசன் மற்றும் ஹஸ்கின்ஸ்	T– செல் வாங்கியைப் பிரித்தெடுத்தனர்.

(தொடர்கிறது)

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 214 19-02-2019 5.54.16 PM