

என்னும் உறையால் சூழப்பட்டு, டிராபிகுலே என்னும் இணைப்புத் திசுவின் இழைகளால் பல சிறிய அறைகளாக பிரிக்கபட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு கதுப்பும் வெளிபுறத்தில் கார்டெக்ஸையும், உட்புறதில் மெடுல்லாவையும் கொண்டுள்ளது. கார்டெக்ஸில் பிரிகின்ற முதிர்ச்சியடையாத லிம்போசைட்டுகள் உள்ளன. மெடுல்லாவில் ரெட்டிகுலார் எபிதீலியல் செல்கள் குறைவான எண்ணிக்கை கொண்ட லிம்போசைட்டுகள், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஹசல்ஸ் காரபசல்களும் உள்ளன. (படம் 13.3) தைமஸின் முதன்மை பணியாது முதிர்ந்த T செல்களை உற்பத்தி செய்வதாகும். எழும்பு மஞ்ஜையில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வரும் முன்னோடி செல்கள் (Precursor cells), புற கார்டெக்ஸ் பகுதிகளில் பெருக்கமடைகின்றன. இவைகள் முதிர்ச்சி அடையும்போது, கிட்டதட்ட 98% செல்கள் இறந்துவிடுகின்றன. ஓம்புயிரின் தன்னிலை ஆன்டிஜெனை அடையாளம் காணும் T செல்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. மீதமுள்ள 2% தைமஸில் மெடுல்லாப் பகுதிக்குச் சென்று முதிர்ந்த T செல்களாக மாறி இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்துவிடுகின்றன. இந்த T செல்கள் ஓம்புநர் அற்ற, தன்னிலையற்ற ஆட்டினஜெனை அடையாளம் கண்டுக்கொள்ளுகின்றன. இந்நிகழ்விற்கு தைமிக் தேர்வு (Thymic selection) என்று பெயர்.

ஆ. எலும்பு மஞ்ஜை

பாலூட்டிகளில், எலும்பு மஞ்ஜையானது B செல்கள் வளர்ச்சி அடைவதற்கான தளமாகும். (படம் 13.4). எலும்பு மஞ்ஜையில் உள்ளே இருக்கும் ஸ்ட்ரோமல் (Stromal) செல்கள் B செல்களுடன் நேரடியான தொடர்பு கொண்டு B செல்களின்



படம் 13.3: தைமஸ் பகுதியின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்ற வரைபடம்



படம் 13.4: எலும்பு மஞ்ஜையின் அமைப்பு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 218 19-02-2019 5.54.20 PM