


படம் 13.6: நிணநீர் முடிச்சின் அமைப்பு

பெயர்வதாக கருதப்படும் T இன்டர்டிஜிடேடிங் டென்டிரைடிக் செல்களும் (Interdigitating dendritic cells) காணப்படுகின்றன. இந்த இன்டர்டிஜிடேடிங் டென்டிரைடிக் செல்கள், T உதவி (T_H) செல்களிடத்தில் ஆன்டிஜெனை வழங்க தேவையான வகை II MHC மூலக்கூறுகளை அதிகளவில் கொண்டுள்ளன. ஆன்டிஜென்களைப் பிடிப்பதில் (சிக்கவைப்பதில்) நிணநீர் முடிச்சுகள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. நிணநீர் மூலமாக ஆன்டிஜென் நிணநீர் முடிச்சை அடைந்து பிடிக்கப்பட்டு, பக்குவப்படுத்தபட்டு, மேலும் பாராகார்டெக்ஸிலுள்ள இண்டர் டிஜிடேடிங் டென்டிரிடிக் செல்களின் வகுப்பு II MHC மூலக்கூறுடன் சேர்ந்து வழங்கப்பட்டு இறுதியாக T_H செல்கள் தூண்டப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட T_H செல்கள் B செல்களின் செயல்பாடுக்கு தேவையான சைட்டோகைகளின்களை வெளியிடுகின்றன. இவ்வாறு B செல்கள் நினைவு (Memory cell) செல்களையும், ஆன்டிபாடியை சுரக்கும் பிளாஸ்மா செல்களாகவும் வேறுபடுத்துவதற்கு ஒரு சூழ்நிலையை நிணநீர் முடிச்சுகள் வழங்குகின்றன.

இ. கோழைப்படலம் தொடர்புடைய நிணநீர் திசு (MALT), தோல் தொடர்புடைய நிணநீர் திசு (SALT)

கோழைப்படல சவ்வுப் பகுதியில் காணப்படும் பிரத்தியோகமான நிணநீர் திசு கோழைப்படலம் தொடர்புடைய நிணநீர் திசு (MALT) என்று அழைக்கப்படுகிறது. MALT பல வகைப்படும். அவற்றில் நன்கு அறியப்பட்டவை குடல் தொடர்புடைய நிணநீர் திசுவாகும் (GALT). இவ்வகை திசுக்கள், தொண்டைச் சதை (tonsils), மூக்கடிச்சதை (adenoids) குடல்வால் (appendix) , சிறு குடலில் உள்ள தனித்திறனுள்ள அமைப்பான பேயர்ஸ் திட்டுகளை (படம் 13.7) உள்ளடக்கியுள்ளன.

இரைப்பைக் குடல்வழி பாதையில்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 220 19-02-2019 5.54.22 PM