



**படம் 13.7:** கோழைப்படலம் தொடர்புடைய நிணநீர் திசு (MALT)

a) விரிவான மால்ட் அமைப்பின் பகுதியான பேயர்ஸ் திட்டு குடலில் காணப்படுகிறது. b) சாயமேற்றப்பட்ட பேயர்ஸ் திட்டின் நிணநீர் புடைப்புகளின் வரைபடம் c) தளர்ந்த நிணநீர் செல்கள், நீர்த்த மூட்டுப்பைகள் தொகுதிகளைக் கொண்ட குடல் அடுக்கு.

உள்ள எபிதீலியல் மேற்பரப்பில் இருக்கும் ஆன்டிஜென்களைத் திரட்டுவதில் பேயர்ஸ் திட்டுக்கள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. பேயர்ஸ் திட்டில் உள்ளச் சிறப்பான எபிதீலியல் செல்களான M செல்கள் (படம் 13.8) ஆன்டிஜெனைச் சேகரிக்கின்றன. லிம்போசைட்டுகள் பாலிகில்களை உருவாக்குகிறது. குறைவான எண்ணிக்கையுடைய T லிம்போசைட்டுகளால் சூழப்பட்ட பெரிய குவிமாடம் (Dome) போன்று குவிந்த B லிம்போசைட்டுகளை மத்தியில் கொண்டுள்ளது. இது போன்று அதிக ஊடுருவும் ஒழுங்கமைப்பு கொண்ட லிம்போசைட்டுகளின் கூட்டம், சுவாச எபிதீலியத்தை பாதுகாக்கின்றன. அவை சுவாசக்குழாய் சார்ந்த நிணநீர் திசுக்கள் (BALT) என்று கூறப்படுகிறன.

தோலின் பாதுகாப்பு அரண்கள் சிறப்பாக இருந்தாலும், சில நேரங்களில் நோய் உண்டு பண்ணுகின்ற நுண்ணுயிரிகள் தோலின் அடியிலிருக்கும் திசுக்குளுக்குள் நுழைந்துவிடுகின்றன. இங்கே நுண்ணுயிரிகள் சிறப்பான செல் குழுக்களான நோய் தொடர்புடைய நிணநீர் திசுவினை (SALT) எதிர்கொள்கிறன. (படம் 13.9)

SALT முக்கிய பணியானது எப்பிடெர்மிஸ் அடுக்கையை மீறி நுழையும் நுண்ணுயிரிகளை கட்டுப்படுத்தி, அவைகளை இரத்த ஓட்டத்தில் நுழையாத வண்ணம் தடுப்பதாகும். SALT ஒரு வகையன லாங்கர்கான்ஸ் (Langerhans) செல்கள் ஒரு சிறப்பான மைலாய்டு செல்களாக ஆன்டிஜென்களை விழுங்க முடியும்.

**உயர் சிந்தனை கேள்விகள்**

மனித உடலில் இருந்து தைமஸ் நீக்கப்பட்டால் என்னவாகும்?



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 221 19-02-2019 5.54.24 PM