
இந்த நடைமுறை குறியிலக்க செல் அழிவிற்குக் காரணமாக அமைகின்றது. பாதிப்படைந்த செல்களையும் புற்றுநோய் செல்களையும் NK செல்கள் அடையாளம் காணும் இரண்டாவது வழிமுறை, விருந்தோம்பி செல்களின் பரப்புகளில் காணப்படும் தனித்தன்மையுடைய புரதப் பொருட்களான MHC II வகை மூலக்கூறுகளைச் சார்ந்தது. விருந்தோம்பி செல் இந்த MHC புரதப்பொருளைத் தன்னிடமிருந்து இழக்குமாயின், அவை எளிதாக சில வைரஸ்கள் அல்லது புற்றுநோய்த் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி NK செல்களால் நுண்துளை உண்டுபண்ணும் புரதப்பொருள்கள் மற்றும் செல்நச்சு நொதிகள் என்று அழைக்கப்படும் கிரன்சைம்ஸ் (granzymes) சுரக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது (படம் 13.16).



படம் 13.16: சாதாரண செல்களையும் மற்றும் MHC 1 வகை மூலக்கூறு இல்லாத அசாதாரண செல்களையும் அடையாளம் காண இயற்கையாகக் கொல்லும் செல்கள் பயன்படுத்தும் முறை



Stem Cell (மூல உயிரணு):
பலவகைப்படுத்தப்பட்ட செல்கள் பெறப்படும் செல். மூல உயிரணுக்கள், அவை உருவாக்கக்கூடிய செல்களின் வகைகளின் அடிப்படையில், டோட்டிபோட்டன்ட், புளூரிப்போட்டன்ட்,மல்டிபோட்டன்ட்அல்லதுயுனிபோட்டன்ட்எனபிரிக்கப்படுகின்றன.

நேக்ரோசிஸ் (உடற்பகுதி இழைம அழுகல்):
உரு அமைப்பின் மாறுபாடுகள் மற்றும் தனி செல் அல்லது செல் குழுக்களின் இறப்பு, செல்லின் உள்அமைப்புகள் புறத்திற்கு வெளியேறுதல் போன்றவை திசுக்களின் படிப்படியான அழிவிற்கும் பிளவிற்கும் வழிவகுக்கும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 228 19-02-2019 5.54.29 PM