
மாறுபட்ட பகுதியில் உள்ள அதிக மாறுபாடு உடைய பகுதிகள் அதிதீவிர மாறுபாடு பகுதிகள் (Hypervariable Regions) அல்லது நிரப்புத்தன்மை நிர்ணயிக்கும் பகுதிகள் (CDRs – Complementarity Determining Regions) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆன்டிஜென் – ஒட்டும் தளத்தை உருவாக்குவதில் அதிதீவிர மாறுபாடு பகுதிகள் மிகவும் இணக்கமாக ஈடுபடுகின்றன.

4. களங்கள் (Domains)

ஒவ்வொரு இம்யூனோகுளோபுலின் சங்கிலியும் டை சல்பைடு இணைப்புகளால் மூடப்பட்ட குளோபுலர் பகுதிகளைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு கன சங்கிலியிலும் நான்கு அல்லது ஐந்து களங்கள் உள்ளன. மாறுபட்ட பகுதியில் ஒன்றும் (V_H), நிலையான பகுதியில் 3 அல்லது 4 (C_H1, C_H2, C_H3, மற்றும் C_H4) யும் உள்ளன. ஒவ்வொரு இலேசான சங்கிலியிலும் இரு களங்கள் உள்ளன. ஒன்று மாறுபட்ட பகுதியிலும் (V_L) மற்றொன்று நிலையான பகுதியிலும் (C_L) உள்ளன.

5. துண்டுகள் (Fragments)

இம்யூனோகுளோபுலின் அமைப்பைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் வரையறுக்கப்பட்ட துண்டுகளாக இம்யூனோகுளோபுலின் மூலக்கூறுகள் சிதைக்கப்படுவதற்கு புரதம் உடைக்கும் நொதிகளான (பெப்டைட் இணைப்பு உடைப்பு) பேபைன் (Papain) மற்றும் பெப்சின் (Pepsin) பயன்படுகிறது (படம் 13.22).



படம் 13.26: சங்கிலி அமைப்பினையும் சங்கிலி இடை டை – சல்பைடு பிணைப்புகளையும் காட்டும் IgG யின் அமைப்பு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 242 19-02-2019 5.54.31 PM