அடைகாக்கத்திற்கு பின்னர், அகார் தட்டுகளில் உள்ள நுண்ணுயிர் குழுக்களின் வளர்ச்சி உற்றுநோக்கப்படுகின்றன.

கோடுகள் இடப்படும் முறையைப் பொறுத்து, முதல் பகுதியில் அதிகமான நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியும், நான்காவது பகுதியில் நுண்ணுயிர் குழுக்கள் தனித்தனியாகவும் காணப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குழுவும் ஒரு தனி பாக்டீரியாவிலிருந்து தோன்றியதாக அனுமானிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, இது தூய வளர்ச்சிக் கலவை என்று கூறப்படுகிறது.

வெற்றிகரமான தனிமைப்படுத்துதல் தனி செல்களைப் பிரிக்கும் இடைவெளியைச் சார்ந்ததாகும் (படம் 5.12).

தகவல் துளி


மைக்ரோமேனிபுலேட்டர் (Micromanipulator) –இச்சாதனம் நுண்ணோக்கியுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் சாதனம் மூலம் ஒரு தனி பாக்டீரியல் செல்லைக் கலப்பு குழுவில் இருந்து பிரித்து எடுக்க முடியும். இதில் மைக்ரோ–பிப்பெட் (Micropipette) அல்லது மைக்ரோபுரோப் (Microprobe – நுண்உணர்வு சாதனம்) உள்ளது. ஆகையால், ஒரு தனி செல்லை எளிதில் பிரித்தெடுக்கலாம்.

5.4 பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை குழுக்களின் வளர்ச்சிப் பண்புகள்

இதற்கு முந்தைய பகுதியில் பல்வேறு வயைான ஊடகங்கள் மற்றும் அதன் தனிப்பட்ட பயன்களைப் பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டோம். நுண்ணுயிரிகளின் அமைப்பைப் பற்றி அறிவது, அவற்றைத் தனிமைப்படுத்துதல், இனங்காணுதல் மற்றும் வகைப்படுத்துதலில் மிக அடிப்படை வரன்முறையாக உள்ளது. நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிப் பண்புகள் வகைப்பாட்டியலில் ஒரு அடிப்படை அலகாகக் கருதப்படுகின்றது.

பாக்டீரியாக்களைத் திட மற்றும் திரவ ஊடகத்தில் வளர்க்கலாம். ஆனால், திட ஊடகத்தின் மேல் கண்டறிவது எளிதாக இருக்கும். திரவ ஊடகத்தில் பாக்டீரியா வளர்ச்சி தெளிவாக இருக்காது. ஒரு வித சமமான கலங்கல் தன்மையுடனும் அல்லது சிறிய வீழ்ப்படிவாக அடிபகுதியிலும், மேற்புறத்தில் மென் உறையாகவும் தோன்றுகிறது.

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிப் பண்புகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள சில அடிப்படை பண்புக் கூறுகள் உள்ளன. வளர்ச்சி ஊடகத்தில் உள்ள பாக்டீரியல் குழுவின் வடிவம், அளவு, நிறம், அமைப்பு, உயரம், விளிம்பு போன்றவை விரிவாக கீழே கூறப்பட்டுள்ளன.



படம் 5.12: கோடு தட்டு முறை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 66 19-02-2019 5.47.30 PM