குழுக்களின் மணம்: சில பாக்டீரியாக்கள் மணம் பரப்பும் தன்மை கொண்டவை. அதன்மூலம் நுண்ணுயிரிகளை இனங்கான முடியும். மழைக்குப் பின் வரும் மண்வாசனை *ஆக்டினோமைசீட்ஸ்* என்னும் பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது. சில பூஞ்சைகள் பழங்களின் மணத்தைப் பெற்று இருக்கும். *எஷ்செரிசியா கோலை* பாக்டீரியா மலத்தின் மணத்தை ஏற்படுத்தும்.

குழு நிறம்: பல பாக்டீரியாக்கள் நிறமிகள் உள்ள குழுக்களை உருவாக்கும் (அட்டவணை 5.3). சில பாக்டீரியல் குழுக்கள் நீரில் கரைக்க முடியாத நிறமிகளைத் தயாரித்து தக்கவைத்துக் கொள்கிறது மற்றும் குழுக்கள், நிறமிகளை செல்லின் உள்ளே எடுத்துக்கொள்வதால் அவை நிறமாக தோற்றம் அளிக்கிறது (படம் 5.14). ஆனால் சில பாக்டீரியா நீரில் கரைக்கூடிய நிறமிகளை உருவாக்கி சுற்றி உள்ள ஊடகத்தில் அந்நிறமியைப் பரவச் செய்யும். எடுத்துக்காட்டு: *சூடோமோனஸ் ஏரோஜினோசா* உற்பத்தி செய்யும் நிறமிக்கு "பயோசைனின்" என்று பெயர். இது நீரில் கரையும் தன்மை கொண்டது மற்றும் ஊடகத்திற்கு ஊதா நிறத்தை வழங்குகின்றது.



படம் 5.14: ஊடகத்தில் காணப்படும் பாக்டீரியல் குழுக்களின் நிறமிகள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சில நீரில் கரையும் நிறமிகள் புளூரசெண்ட் தன்மை கொண்டவை. எடுத்துக்காட்டு: பையோவெர்டின். இவை, குழுக்களை, சுற்றிய அகார் ஊடகம் அல்ட்ரா வயலெட் (Ultraviolet) கதிர்களுக்கு உட்படுத்தும்போது அவை, வெள்ளை அல்லது நீலநிறத்தை உமிழ்கின்றன.

5.4.2 திரவ ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியின் தன்மை

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி கலவை திரவம் முழுவதுமாகப் பால் போன்று மற்றும் மேகத் திரளாகவும் இருந்தால் அது கலங்கிய நிலை என்று அழைக்கப்படும்.

செல்கள் குழாய் அடியில் தேங்கி இருந்தால் அவை வீழ்படிவு எனப்படும்.

பாக்டீரியல் வளர்ச்சி தொடர்ச்சியான அல்லது இடையூறுடன் கூடிய மேல் படர்வுடன் திரவ கலவையில் இருந்தால், அதை மென்படலம் (Pellicle) என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 5.15).

5.4.3 பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் குழுக்களின் பண்புகள்

பூஞ்சைகள் யூகோர்யாடிக் உயிரினங்கள் ஆகும். அவை ஒரு செல் ஈஸ்ட்டாகவும் (Yeast) மற்றும் பல செல்கள் கொண்ட இழை பூஞ்சைகளாகவும் (filamentous Mold) இருக்கின்றன. சில பூஞ்சைகள் இருவித தோற்றத்தில் (Dimorphic) இருக்கின்றன. பொதுவாகப் பூஞ்சைகள் அமிலத் தன்மையில் விரும்பி வளருகின்றன.



படம் 5.15: திரவ ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 68 19-02-2019 5.47.31 PM