அட்டவணை 5.3: நிறமி பாக்டீரியாக்களின் நிறமிகள்

பாக்டீரியா	நிறம்
செரேஷியா மார்ச்சனஸ்	சிவப்பு
ஸ்டைபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ்	தங்க நிற மஞ்சள்
மைக்ரோகாக்கஸ் லூடியஸ்	மஞ்சள்
சூடோமோனஸ் ஏரோஜினோசா	பச்சை

சாப்ரோட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார் ஊடகம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு அகார் ஊடகம் பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன. சாப்ரோட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார் (SDA – Sabourad's Dextrose Agar) ஊடகத்தி'ன் அமிலத்தன்மை பாக்டீரியா வளர்ச்சியைக் குறைக்கும்.

பூஞ்சை குழுக்களின் நிறம், மேற்புரம், பின்புறம், மேற்புரத்தின் தன்மை (பொடி, துகள், கம்பளி, பஞ்சு, மென் பூம்பட்டு (Velvete) அல்லது உரோமங்கள்அற்றது (Glabrous)) இடவமைப்பு (Topography) உயரம், மடிப்பு, விளிம்பு மற்றும் வளர்ச்சியின் கால அளவு போன்ற பண்புகள் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

ஈஸ்ட் கேண்டிடாவின் வளர்ச்சிப் மற்றும் குழு பண்புகள்

ஈஸ்ட்கள், சாப்ரோட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார் (Sabouraud Dextrose Agar) காற்று உள்ள சூழலில் வளர்க்கப்படுகிறது. பூஞ்சைக் குழுக்கள் பசைக் குழுக்களாக வளர்ந்து ஈஸ்ட்டின் மணத்தை வெளியிடுகிறது. வெவ்வேறு ஈஸ்ட்டு குழுக்களின் புறத்தோற்றம் மாறுபடுகின்றன (படம் 5.16.அ). SDA ஊடகத்தில் ஈஸ்ட் குழுக்கள் மிருதுவான தன்மையும் பாக்டீரியா குழுக்களை விட பெரியதாகவும் இருக்கின்றன.

மியூக்கர் வளர்ச்சி மற்றும் குழுக்களின் பண்புகள்

பூஞ்சைகளின், மியூகர் (Mucor) இப்பூஞ்சை வெள்ளை, பழுப்பு, அல்லது சாம்பல் நிறம் உடையவை மற்றும் வேகமாக வளரும் தன்மை கொண்டது.

ஸ்போர் உற்பத்தியால் பழைய பூஞ்சைக் குழுக்கள் சாம்பல் நிறத்தில் இருந்து பழுப்பு நிறத்திற்கு மாறுகின்றன (படம் 5.16.ஆ)

தகவல் துளி

டைமார்பிக் பூஞ்சை என்ற (Dimorphic) பூஞ்சைகள் இழைப் பூஞ்சைகளாகவோ, ஈஸ்ட்டாகவோ இருப்பது அதன் சுற்றுபுறச் சூழல் உடலியல் நிலைகளைச் சார்ந்தது. எடுத்துக்காட்டு: *ஹிஸ்டோபிளாஸ்மா கேப்சூலேட்டம்* – மனித நோய்க்கிருமியான இப்பூஞ்சை அறை வெப்பநிலையில் இழை பூஞ்சையாகவும், மனித உடலின் வெப்பநிலை–யில் ஈஸ்ட் போன்றும் வளருகின்றன.





படம் 5.16: A சாப்ரோட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார்–பூஞ்சை வளர்ச்சி
அ) ஈஸ்ட் வளர்ச்சி ஆ) இழை பூஞ்சை வளர்ச்சி

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 69 19-02-2019 5.47.31 PM