### 7.9.2 வளர்ச்சி

இவை காற்று சுவாசி மற்றும் தன்னிலை விரும்பும் காற்றுசுவாசிகள். இவைகளுக்கு உகந்த வெப்பநிலை 37°C மற்றும் pH 7.75 ஆகும். இவை பின்வரும் ஊகடத்தில் வளர்கின்றன. அட்டவணை 7.12 குழுக்களின் புறத்தோற்றத்தினை காட்டுகின்றது.

**அட்டவணை 7.12:** ஷிகெல்லா குழுவின் புறத்தோற்றம்

| ஊடகம் | குழுவின் புறத்தோற்றம் |
|---|---|
| சத்து அகார் | குழுக்கள் பெரிய வட்டமானது மிருதுவான ஒளி ஊடுருவும் தன்மை கொண்டது |
| மெக் கான்க்கி அகார் | நிறமற்ற குழுக்கள் (லாக்டோஸ் நொதிக்காதவை) |
| SS – அகார் | கருப்பு நிற மையம் கொண்ட நிறமற்ற குழுக்கள் |

### 7.9.3 நோய் நிலை

சால்மொனெல்லா டைபி டைபாய்டு காய்ச்சலை உண்டாக்குகிறது. அதன் நோய்நிலை வழிமுறை வரைபடம் 7.6 ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

**நோய் தொற்றின் ஆதாரம்:**


உணவு, மலம், விரல்கள், ஈக்கள் செல்லும் வழி – மலவாய் வழி (உட்செல்லுத்துதல்)

இன்குபேஷன் காலம் – 7–14 நாட்கள்

### 7.9.4 நோய் தோற்றம்

நோயனாது வழக்கமாக தலைவலியில் ஆரம்பித்து, உடல்சோர்வு (அசௌகரியம் உணர்தல்) பசியின்மை பூசப்பட்ட நாக்கு, மலக்சிக்கல் அல்லது வயிற்றுப்போக்கினால் வயிற்று பகுதியில் உபாதை ஏற்படும்.

- ஹெப்பாட்டோஸப்லோனோ மெகாலை (கல்லீரல் மற்றும் மண்ணிரல் வீக்கம்). படிப்படியான பைரைக்சியா (தொடர்ச்சியான காய்ச்சல்) மற்றும் இளஞ் சிவப்பு – புள்ளிகளை (இரண்டு அல்லது மூன்றாவது வாரத்தில் ஏற்படுத்துகிறது).




**வழிமுறை வரைபடம் 7.6:** சால்மொனெல்லா டைபியின் நோய் நிலை



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 135 2/14/2020 4:48:45 PM