அட்டவணை 11.4: தேசிய நோய்தடுப்பியல் அட்டவணை

வ. எண்	தடுப்பு மருந்து	செலுத்தப்படும் வயது	செலுத்தப்படும் வழி
1.	பி.சி.ஜி	பிறந்தவுடன்	தோலினுள்
2.	ஹெப்படைட்டிஸ் பி பிறந்தவுடன் அளவு	பிறந்தவுடன்	தசையினுள்
3.	OPV–O	பிறந்தவுடன்	வாய்வழி
4.	OPV 1, 2, 3	6–வது வாரத்தில் 10–வது வாரத்தில் 14–வது வாரத்தில்	வாய்வழி
5.	பென்டாவேலன்ட் 1, 2, 3 டிப்தீரியா பெர்டூசிஸ் டெட்டனஸ்+ ஹெப்படைட்டிஸ் B+ Hib	6–வது வாரத்தில் 10–வது வாரத்தில் 14–வது வாரத்தில்	வாய்வழி
6.	செயலிழக்கப்பட்ட போலியே தடுப்பு மருந்து	6 மற்றும் 14–வது வாரம்	தசையினுள்
7.	ரோட்டாவைரஸ் (தேவைப்படுமெனில்)	6–வது வாரத்தில் 10–வது வாரத்தில் 14–வது வாரத்தில்	வாய்வழி
8.	நியுமோகாக்கஸ் இணைக்கப்பட்ட தடுப்பு மருந்து	6–வது வாரத்தில் 10–வது வாரம் 9–வத மாதம் முடிந்த பிறகு (ஊக்க அளவு)	தசையினுள்
9.	மிசல்ஸ்/ரூபெல்லா முதல் அளவை	9–வது மாதம் முடிந்தபிறகு	தோலின் கீழ் அல்லது தோலுக்கடியில்
10.	டி.பி.டி ஊக்க அளவு II	16–24 மாதங்கள்	தசையினுள்
11.	OPV–ஊக்கி	16–24 மாதங்கள்	வாய்வழி
12.	டி.பி.டி.ஊக்கி –2	5–6 வருடங்கள்	தசையினுள்
13.	TT	10 வருடங்கள் மற்றும் 16 வருடங்கள்	தசையினுள்

இவைகள் துணையூக்கி செயலை கொண்டுள்ளது. ஆனால் தற்பொழுது அலுமினியம் அல்லது கால்சியம் உப்புகள்ள் மட்டுமே மனிதர்களுக்கு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆன்டிஜென்களை மெதுவாக வெளியேற்றவும், ஆன்டிஜெனகளின் அமைப்பை பாதுகாக்கவும், ஆன்டிஜன் வழங்கும் செல்களின் இலக்கு மற்றும் செல் நச்சு லிம்போசைட்களை தூண்டவும் இவ்துணையூக்கிகளின் பண்பு அமைதிருக்க வேண்டும்.

11.6 புதுப்பிக்கப்பட்ட தேசிய நோய்தடுப்பு மருந்திடல் திட்ட அட்டவணை

நோயதடுப்பு மருந்திடல்/ தடுப்பு மருந்தேற்றமானது உடலில் இயற்கையாக நோய்தொற்றுக்களுக்கு ஏற்படும் செயல்வினைவு போன்று உடலில் செயல் விளைவை உண்டாக்கும் (அட்டவணை 11.4) எனவே நோயினால்–உடல் நலமின்மை ஏற்படுவதற்கு முன்பே நோயதடுப்பு மருந்திடல் அல்லது நோய் தடுப்பு மருந்துகள் உடலை

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 247 2/14/2020 4:54:29 PM