அவை மோனோசாக்கரைடுகள், ஒலிகோசாக்கரைடுகள் மற்றும் பாலிசாக்கரைடுகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

- ஆல்டோஸ் மற்றும் கீட்டோஸ்கள், மோனோசாக்கரைடு ஐசோமர்களாகும்.
- கார்போஹைட்ரேட்டுகள் தகுந்த காரணிகள் முன்னிலையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்க வினைகளுக்கு உட்படும் தன்மை கொண்டுள்ளன.
- மோனோசாக்கரைடுகளிலுள்ள ஆல்டிஹைடு மற்றும் கீட்டோ தொகுதிகள், அதே மூலக்கூறிலுள்ள ஏதேனுமொரு ஹைட்ராக்சி தொகுதியுடன் வினைப்பட்டு, ஹெமிஅசிட்டால் அல்லது ஹெமிகீட்டால்களை உருவாக்க முடியும்.
- **C-1** சீர்மையற்ற மையத்தில், வேறுபட்ட அமைப்பை கொண்டுள்ள சர்க்கரைகள் "ஆனோமர்கள்" என அறியப்படுகின்றன. **C- 4** இல் உள்ளவை "எபிமர்கள்" என்றழைக்கப்படுகின்றன.

மதிப்பீடு

7CV7G2

I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. பின்வரும் சிறப்பு தொகுதிகளில் , கார்போஹைட்ரேட்டுகளில் காணப்படுபவை

அ) ஆல்கஹால் மற்றும் கார்பாக்ஸில் தொகுதிகள்

ஆ) ஆல்டிஹைடு மற்றும் கீட்டோன் தொகுதிகள்

இ) ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதிகள் மற்றும் ஹைட்ரஜன் தொகுதிகள்

ஈ) கார்பாக்ஸில் தொகுதிகள் மற்றும் மற்ற தொகுதிகள்

2. பின்வருவனவற்றுள் ஒடுக்கும் பண்பை கொண்டது_____

அ) குளுக்குரானிக் அமிலம் ஆ) குளுக்கானிக் அமிலம்

இ) குளுக்காரிக் அமிலம் ஈ) மியுகிக் அமிலம்

3. ஸ்டார்ச்சை, அமைலேஸ் நொதி கொண்டு நீராற்பகுக்கும்போது கிடைக்கும் இறுதி விளைபொருள்_____

அ) கரையும் ஸ்டார்ச் ஆ) குளுக்கோஸ்

இ) டெக்ஸ்டிரின்கள் ஈ) மால்டோஸ்

Unit 5_127-159.indd 157 11/06/18 6:12 PM