குறிப்பு:

ஊட்டச்சத்து உணவாக பைடோஸ்டெரால்கள்:

மனித குடலில், கொலஸ்டெரால் உறிஞ்சு தளங்களை தாவர ஸ்டெரால்கள், அடைத்துக் கொள்வதாக மருத்துவ பரிசோதனைகள் காட்டுகின்றன. அதாவது, மனிதர்களில் இவை கொலஸ்டெரால் உறிஞ்சுதலை குறைக்க உதவுகின்றன. தற்போது அமெரிக்க இதய கூட்டமைப்பு ஆனது, உயர் கொலஸ்டெரால் நோய் கண்டறியப்பட்ட நோயாளிகள் மட்டுமே தாவர ஸ்டெரால்களை, ஊட்டச்சத்து உணவாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என பரிந்துரைத்துள்ளது.

6.5.1. கொலஸ்டிரால்


கொலஸ்டிரால் பரவலாக அனைத்து உயிரணுக்களிலும் காணப்படுகிறது. மேலும் இது செல் சவ்வு மற்றும் லிப்போபுரதங்களின் முக்கிய ஆக்கக்கூறாகும்.

அமைப்பு


கொலஸ்டிரால் ஒரு C_{27} சேர்மம், இதன் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $C_{27}H_{46}O$. ஆகும். இது C_3 ல் ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதியையும், C_5 மற்றும் C_6 க்கு இடையே ஒரு இரட்டை பிணைப்பையும் கொண்டுள்ளது. **C17** இல் பக்கச் சங்கிலி இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பு:

இரத்த கொலஸ்டிரால் அளவின் சாதாரண மதிப்பு < 200 mg / dL



(a) கொலஸ்டிரால்



(b) எர்கோஸ்டெரால்

Unit 6_160-185.indd 176 11/06/18 6:12 PM