
தசை மடிப்புகளால் ஆன சைனு ஆரிக்குலார் கணுவாகும். இந்த இயக்கம் அலையாக இதயத்தில் பரவுகிறது. ஈ.சி.ஜி யில் காணப்படும் அலைகள் இதயம் சுருங்குவதால் ஏற்படுவது அல்ல, இது **முனைப்பியக்க நீக்கத்தால்** (*Depolarization*) ஏற்படுவதாகும். இதயத்தசை சுருங்கத் துவங்கும் முன்பே, மின்முனைப்பியக்க நீக்க அலை தோன்றுகிறது. ஒரு சாதாரண ஈ.சி.ஜி யில் மூன்று அலைகள் காணப்படும். இது *P* அலை *QRS* கூட்டமைப்பு மற்றும் *T* அலை எனக் குறிக்கப்படுகிறது. *PQRST* கூட்டமைப்பு படம் 7.8 லும் ஈ.சி.ஜி கட்ட வரைபடம் (*ECG graph*), படம் 7.9 லும் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.




படம் 7.8 ஈ.சி.ஜி யின் கட்ட வரைபடம்

P அலை (ஆரிக்குலார் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் – (Atrial depolarization)


இவ்வலை ஆரிக்கிளில் தோன்றும் **மின்முனைப்பியக்க நீக்க நிலையை** (*Depolarisation*) குறிக்கும். இது ஒரு சிறிய மேல் நோக்கிய அலையாகும். இது சைனு ஆரிக்குலார் கணுவில் தோன்றிய தூண்டல், ஆரிக்கிள்களில் பரவ எடுத்துக்கொள்ளும் காலஅளவைக் குறிக்கின்றது. இரண்டு ஆரிக்கிள்களின் சுருக்கத்திற்கான கால அளவு ***0.08 – 0.1* வினாடி** ஆகும்.

PQ இடைவெளி (ஆரிக்குலோ – வென்ட்ரிக்குலார் கணு தாமதம்) – (AV node delay)


இது *P* அலை தோன்றியது முதல் *QRS* கூட்டமைப்பு அலைகள் தோன்றும் வரை உள்ள இடைவெளியாகும். இந்நிலை ஆரிக்கிள்களின்




(1) SA கணுவால் துவக்கப்பட்டமின் முனைப்பியக்க நீக்கம் P அலையை உருவாக்குகிறது.




(2) ஏட்ரிய மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் நிறைவடைந்தவுடன் AV கணுவில் மின் தூண்டல் தாமதப்படுத்தப்படுகிறது.




(3) வென்ட்ரிகிள் மின் முனைப்பியக்க நீக்கம் நுனியிலிருந்து தொடங்குகிறது. இது QRS கூட்டமைப்புக்கு காரணமாகிறது. ஏட்ரியத்தில் மின் முனைப்பியக்கம் மீட்சியடைகிறது.



(4) வென்ட்ரிகிள் மின் முனைப்பியக்க மீட்சி நிறைவடைதல்



(5) நுனியிலிருந்து தொடங்கும் வென்ட்ரிகிள் மின் முனைப்பியக்க மீட்சியின் விளைவாக உருவாகும் T அலை.



(6) வென்ட்ரிகிள் மின் முனைப்பியக்கம் நிறைவடைதல்

படம் 7.9 ஈ.சி.ஜி யின் கட்ட வரைபடத்தின் நிலைகள்

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch07.indd 144 06-02-2020 2.46.15 PM