
காரணங்கள்:

இயற்கையில் சிலிகான் படிகங்கள் அதிகமாக காணப்படுகிறது. (எ.கா) பாறை, பூமித்துகள்கள். அந்த பகுதியில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு இந்நோய் உண்டாக அதிக வாய்ப்புள்ளது. அத்தொழிளாவன: நிலக்கரி தொழிற்சாலை, துளை போடுதல், கல் உடைத்தல், கற்சுரங்கத் தொழிலாளர்கள், சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள், மரம் அறுப்பவர்கள், அடிதள வேலைகள், கண்ணாடி உருவாக்குதல், கட்டுமானங்கள்.



அடையாளங்களும், அறிகுறிகளும்:



Normal Lung **Silicosis Lung**

- மூச்சுத்திணறல் (வேலை செய்யும்போது அதிகமாகும்).
- இருமல், தொடர்ந்து இருமல்மற்றும் சில நேரங்களில் கடுமையாக உடல் சோர்வு
- அதிகமாக மூச்சு விடுதல்
- பசியின்மை
- எடை குறைவு, மார்பு வலி
- காய்ச்சல்
- நகப்படுக்கையிலுள்ள புரோட்டின் சிதைவடைவதால் நாளடைவில் கீறல் விழுந்து தோன்றும்.

இறுதி நிலையில்:

- நீலநிறமாதல் (*Cyanosis*)
- கார்பல்மோனல் (*Corpulmonale*)
- மூச்சுவிடுதலின் குறைபாடு (*Respiratory insufficient*)

நோய் கண்டறிதல்.

- நோயின் வரலாறு கண்டறிதல்.
- உடல் பிரிசோதனைகள்.
- மார்பு எக்ஸ்ரே (*Chest X-ray*)
- நுரையீரல் செயல்பாட்டினை அறிதல் (*Pulmonary Function Test*) இதன் மூலம் காற்றோட்டம் தடைபடுதல், நரையீரல் குறைபாடுகளைக் கண்டறியலாம்.

சிகிச்சை:

சிலிகோசிஸ் மீளமுடியாத நோய் ஆகும். நோய் அறிகுறிகளையும், விளைவுகளையும் மட்டும் தவிர்க்க முடியும். ஆனால் குணப்படுத்த முடியாது. அவையாவன:

- மேலும் சிலிகாவினால் பாதிக்கப்படுவதிலிருந்து தடுக்க வேண்டும்.
- புகையிலை மற்றும் நுரையீரலை எரிச்சலூட்டும் மற்றபொருட்களிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்.
- இருமலைக் குறைக்கும் மருந்துகள் உட்கொள்ள வேண்டும்.
- பாக்டீரியத் தொற்றுக்கு ஆண்டிபயாடிக் (*Antibiotic*) மருந்துகள்.
- காசநோய் என்று கண்டறியப்பட்டால் அதற்கான சிகிச்சை தர வேண்டும்.
- மார்பு பயிற்சி (*Chest physiotherapy*) மூலம் சளியை நீக்கலாம்.
- ஹைப்பாக்ஸிமியா (*Hypoxemia*) இருந்தால் ஆக்ஸிஜன் அளிக்கலாம்.

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit_3.indd 99 1/4/2020 7:58:47 PM