தொல்லைகளை ஏற்படுத்துவதுடன் இயல்பாக செயல்படுதலை பாதிக்கும். இதன் அறிகுறிகள் சில மணிநேரம் முதல் பல நாட்கள் வரை காணப்படலாம்.

❖ **மாதவிடாய் துவக்கநிலை மனக்குழப்ப நோய் (PMDD)** *Premenstrual Dysphoric Disorder:* இந்த நோய் (PMS) ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் மாதவிடாய் நோயின் அடுத்த நிலையாகும். இது 3% முதல் 8% பெண்களை இனப்பெருக்க வயதில் பாதிக்கிறது. இந்நோய்க்கு மருத்துவ சிகிச்சை அவசியமாகிறது.

❖ **மாதவிலக்கின்மை** (Amenorrhea): இது மாதவிடாய் அற்ற நிலையாகும்.

❖ **முதல் நிலை மாதவிலக்கின்மை** (Primary amenorrhea): பூப்பெய்திய உடன் மாதவிலக்கு அற்று இருப்பதாகும்.

❖ **இரண்டாம் நிலை மாதவிலக்கின்மை** (Secondary amenorrhea): மாதவிடாய் சமநிலை மற்றும் இயல்பான மாதவிடாய் சுழற்சிகள், மிகவும் அசாதாரணமான ஒழுங்கற்ற நிலை மற்றும் மாதவிடாய் இல்லாத நிலையாக மாறுவது.


❖ **வலிமிகு மாதவிடாய்** (Dysmenorrhea): இது அதிகப்படியான மற்றும் தீவிரமான மாதவிடாய் கருப்பை தசைப்பிடிப்பு மற்றும் வலியைத் தருவதாகும்.

❖ **முதல்நிலை வலிமிகு மாதவிடாய்** (Primary Dysmenorhea): உடலிலுள்ள வேதிப்பொருட்களின் சமநிலை மாற்றத்தால் பெண்ணின் கருப்பை தசைப்பிடிப்பு ஏற்படும். இது பெரும்பாலும் இளம் பருவத்தினருக்கு ஏற்படுகிறது.

❖ **இரண்டாம் நிலை வலிமிகு மாதவிடாய்** (Secondary Dysmenorhea): இந்நிலை மற்ற மருத்துவ காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக கருப்பை உட்சுவர் நோய்களால் இது நேரிடலாம்.

❖ **மாதவிடாய் மிகைப்பு** (Menorrhagia): இது அதிகப்படியான இரத்தப்போக்கை குறிக்கும்

மாதவிடாய் சுழற்சி



XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd 152 1/5/2020 10:40:43 AM