❖ டாப்லர் ஆய்வின் மூலம் குழந்தையின் இதயத்துடிப்பை கேட்க இயலுகிறது.



13–16 வாரங்கள் (நான்கு மாதம்)

❖ உதடுகளால் உறிஞ்சக் கற்றுக்கொள்கிறது.
❖ கடின அண்ணம் இணைகிறது.
❖ சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு உருவாகிறது.
❖ எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகள் தனித்தனியாக அடையாளம் காண முடிகிறது.
❖ உணவுப்பாதையில் 'மெகோனியம்' எனப்படும் உணவுக்குழல் கழிவு காணப்படுகிறது.



17–20 வாரங்கள் (5 வது மாதம்)

❖ கண்விழி மற்றும் புருவம் காணப்படுகிறது.
❖ லானுகோ (Lanugo) (மெல்லிய பட்டுப்போன்ற உரோமம்) காணப்படுகிறது.
❖ குயிக்கனிங் (Quickening) ஏற்படுகிறது. (தாய் உணரக்கூடிய அளவிலான குழந்தையின் முதல் அசைவு)
❖ சராசரியாக குழந்தையின் தலைப்பகுதி வரையிலான உயரம் 19செ.மீ வரை இருபதாம் வாரத்தில் காணப்படுகிறது.



உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சி மூன்று முக்கிய காரணிகளை சார்ந்தது. 60% வளர்ச்சியானது மரபணுக்களாலும், 10% தாயின் உணவு முறைகளாலும், 30% கருப்பையின் உட்புற சூழ்நிலையாலும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஐந்தாவது வாரம், முதல், குழந்தை தன் இரு கைகளாலும் இரு காதுகளையும் வெளிப்புற அதிக சத்தத்தின் காரணமாக மூடிக்கொள்ள முடியும்.

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd 160 1/5/2020 10:40:49 AM