- **ஸ்ட்டிரையே கிராவிடாரம்** (*Striae gravidarum*) – அடர் பழுப்பு மற்றும் வெள்ளிநிற கோடுகள் வயிறு முழுவதும் காணப்படுதல்.
- **லினியா நயாக்ரா** (*Linea niagra*) – பெண்ணுறுப்பு தொடங்கி தொப்புள்வரை அடர்நிறக்கோடு காணப்படுதல்.
- **குல்லன்ஸ் அறிகுறி** (*Cullens sign*) – தொப்புள் பகுதியை சுற்றி நீல நிறத்தில் தோலில் நிறமாற்றம் காணப்படுதல்.
- **தழும்புகள்** – ஏதேனும் பிளவுற்ற தழும்புகள் உள்ளதா என ஆய்வு செய்தல்.

வயிற்றுப்பகுதி எல்லைக்கோடுகள் (*CONTOUR OF THE ABDOMEN*)

வயிற்றுப்பகுதி எல்லைகளை கவனிப்பதன் மூலம் வயிறு வீக்கம் கண்டறியப்படுவதுடன், வீக்கம் ஒரு சிறு பகுதி அல்லது முழு வயிற்றுப் பகுதியை பாதித்திருக்கிறதா என கண்காணித்தல் வேண்டும். இவ்வாறே பக்கவாட்டுப்பகுதிகளும் வீக்கத்தை கண்டறிய கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.

காணக்கூடிய அளவிலான கரு அசைவுகளை கவனித்தல். அசைவுகள் ஒரு வேளை காண இயலாத நிலையில் தாயிடம் உறுதி செய்து கொள்க.



ஸ்டிரையே கிராவிடாரம்



லினியா நயாக்ரா

2. தொட்டறிதல் பரிசோதனை: கருப்பையினை வெதுவெதுப்பான கரங்களால் தொட்டு உணர்தல்.

படி 1: இடது கரத்தினை சற்று வளைத்து பெண்ணின் வயிற்றில் சிம்பைஸிஸ் பியூபிஸ் என அழைக்கப்படும் இடுப்பு முன்னெலும்பு இணைப்பிற்கு இணையாக வைத்து கருவளர்ச்சி உயரத்தை கண்டறிக.

- மார்பெலும்பு முடிச்சுப்பகுதியில் தொடங்கி இடுப்பு முன்னெலும்பு இணைப்பை நோக்கி தொடர்ந்து ஆய்வு செய்க. இந்த ஆய்வினை கருப்பையின் தலைப்பகுதி/ சதைப்பற்று வீக்கம் தென்படும் வரை செய்க.
- கருவளர்ச்சி உயரத்தை குறித்துக் கொள்க.



XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd 171 1/5/2020 10:40:51 AM