3. இடுப்பெலும்பு பகுதி பிடிப்பு– / இடுப்பெலும்பு மேற்பகுதி பிடிப்பு

இடுப்பெலும்பினுள் குழந்தையின் தலை அல்லது புட்டம் பொருந்தியிருக்கிறதா என அறிவதற்கும், குழந்தையின் உடல்பகுதி தளர்வாகவோ, மிகச்சரியாக பொருந்தியிருக்கிறதா அல்லது தொடர்பற்று இருக்கிறதா எனவும் அறிய உதவுகிறது.



4. இடுப்பெலும்பு பகுதி பிடிப்பு /இடுப்பெலும்பு ஆழ்ப்பகுதி பிடிப்பு

குழந்தையின் தலை மடக்கப்பட்டிருக்கும் கோணத்தை கண்டறிய உதவுகிறது.



குழந்தையின் அசைவுகளைக் கண்டறிதல் அல்லது கேட்டறிதல்

- கருவின் அசைவுகளே சிசுவின் நலத்தை வரையறுக்கும் முக்கிய குறியீடாகும்.
- இது 18–22 வாரங்களுக்கிடைப்பட்ட கர்ப்பகாலத்தில் உணரப்படுகிறது. (முதல் கர்ப்பத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அடுத்தடுத்த கர்ப்பகாலங்களில் இது வெகு சீக்கிரம் உணரப்பட்டு விடுகிறது.)
- பொதுவாக ஒரு பெண்ணின் கர்ப்பகாலத்தில் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 10–12 சிசு அசைவுகள் உணரப்படுகின்றன.
- குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சிசு அசைவுகள் கருவறையின் சாதகமற்ற வளர் சூழ்நிலையைக் குறிப்பதாகும்.
- சிசுஅசைவுறும் முறையானது குறைந்த கருவறை இடைவெளியின் காரணமாக பிரசவத்திற்கு முந்தைய தினங்களில் மாற்றம் பெற்று காணப்படும்.
- ஒரு வேளை சிசுவின் அசைவானது உணரப்படாமலோ சிசு அசைவற்று இருந்தாலோ செவிலிய உதவியாளரை அல்லது மருத்துவரையோ அணுகவும்.

3. ஒலிசோதனை (AUSCULTATION)

- கருக்குழவி (Fetoscope) அல்லது இதயத் துடிப்பு மானியை உபயோகிக்கவும்.
- சிசுவின் முதுகுப்பகுதி அல்லது பக்கவாட்டுப் பகுதியில் தெளிவாக கேட்க இயலும்.
- வெர்டெக்ஸ் பிரசன்டேஷன் எனப்படும் சிசுவின் தலைப்பகுதி தாயின் உதாரவிதானத்தின் அருகமைந்தவாறு சிசு இருக்குமானால், சிசுவின் இதயத்துடிப்பானது (FHS) தாயின் தொப்புளுக்கும் இடுப்பெலும்பின் முன்பக்க கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கற்பனைக் கோட்டிற்கு நேர் பின்பகுதியில் தெளிவாக உணரப்படுகிறது.



XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd 173 1/5/2020 10:40:54 AM